Flexi-Seal™
SIGNAL™ FMS
HÅNDTERING AV AKUTT DIARÉ



Valgt på nasjonalt sykehusanbud!

BEDRE PLEIE, BESKYTTELSE OG STØRRE VERDI*



ISOLER *Clostridium difficile* - før den rammer

Har du råd til å la være?

Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS er et lukket system som er utviklet for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner ved å samle opp tynn til halvtynn avføring. Det er vitenskapelig dokumentert at Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS effektivt reduserer spredning av *C. difficile*.** [9]

AVDELINGEN:

Med Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS kan pleiepersonalet bruke mindre tid på håndtering av diaré og mer tid på annen pasientpleie. Ved å redusere komplikasjoner forbundet med hudskader og krysskontaminering, kan sykehusene spare på behandlingskostnader*, redusere innleggelsestiden og frigjøre sengeplasser.[5,4]

- Mindre tid på håndtering av diare og mer tid på annen pasientpleie
- Redusere behandlingskostnader*
- Redusere innleggelsestid og frigjøre sengeplasser[5,4]

PASIENTEN:


Ved å innføre Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS som standard i pleien av pasienter kan du være med på å redusere antallet kostbare komplikasjoner som er forårsaket av eksponering for avføring.

- Redusere komplikasjoner[11,4]
- Redusere faren for trykksår[3]
- Øke pasientens velbefinnende og verdighet*, [11]
- Designet til å håndtere ubehagelig lukt.

SAMFUNNET:

Både C. difficile og trykksår er forbundet med forlengelse av sykehusopphold og økede behandlingskostnader[8,9]
Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS er et lukket system som er utviklet for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner ved å samle opp tynn til halvtynn avføring. Disse infeksjonene fører til forlengede sykehusopphold og mer omfattende behandling og diagnostikk med påfølgende økte kostnader.[7,8]

- Redusere risikoen for spredning av infeksjoner** [9]
- Redusere behandlingskostnader*, [7,8]
- Frigjøre sengeplasser ved redusert innleggelsestid[5,4]




*Sammenlignet med tradisjonell håndtering av akutt diaré
**Som vist in vitro.

Flexi-Seal™
SIGNAL™ FMS
HÅNDTERING AV AKUTT DIARÉ



PRODUKTFORDELER

1. SIGNAL™-indikatoren er en visuell indikasjon som skal forhindre overfylling av cuffen og som dermed angir optimal oppfylling
2. Kateter som har luktbarriere i sin fulle lengde og en myk kuff
3. Patentert, blå fingerlomme for enkel innføring og nøyaktig plassering av kateteret
4. Oppsamlingspose med kullfilter
5. Prøvetakingsporten gir tilgang til kateteret, så det er sikkert og enkelt å ta avføringsprøver
6. Sort lukkeklemme til administrasjon av lege-middel via irrigasjonsporten
7. Tydelig merking på irrigasjonsporten merket IRRIG./Rx->



Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS system til håndtering av akutt diaré

Beskrivelse	Antall/eske	Varenr.
Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS kit	(1 kit / eske, 3 poser)	418000
Privacy™ oppsamlingspose	(10 poser / eske)	411108

Flexi-Seal Signal™ FMS kan enkelt bestilles i ditt lokale bestillingssystem.

Referanser: HPIS. Q2 2011 data. Moving Annual Total (MAT) Fecal Control Category. Ikke publiserte data, ConvaTec [2].Faria DT, Shwayder T, Krull EA. Perineal skin injury: extrinsic environmental factors. Ostomy Wound Management. 1996 Aug;42(7):28-30, 32-34. [3].Keller BP, Wille J, van Ramshorst B, van der Werken C. Pressure ulcers in intensive care patients: a review of risks and prevention. Intensive Care Med. 2002;28(10):1379-1388. [4].Zhan C, Miller MR. Excess length of stay, charges and mortality attributable to medical injuries during hospitalization. JAMA. 2003;290(14): 1868-1874. [5].Kyne L, Hamel MB, Polavaram R, Kelly CP. Health care costs and mortality associated with nosocomial diarrhea due to Clostridium difficile. CID, 2002;34:346-53. [6].Geffers C, Gastmeier P. Nosocomial infections and multidrug-resistant organisms – epidemiological data from KISS. DtschArztebllnt 2011; 108(6): 87-93. [7].Beyersmann J, Gastmeier P, Grundmann H, Bärwolff S, Geffers C, Behnke M, Rüden H, Schumacher M. Use of multistate models to assess prolongation of intensive care unit stay due to nosocomial infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(5): 493-499. [8].Pittet D, Tarara D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infection in critically ill patients. Excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA. 1994;271(20):1598-601. [9].Jones S, Towers V, Welsby S, Wishin J, Bowler P. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management, 2011;57(10): 38–49. [10]. O'Brien JA, Lahue BJ, Caro JJ, Davidson DM. The emerging infectious challenge of Clostridium difficile-associated disease in Massachusetts hospitals: clinical and economic consequences. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007:28(11):1219-1227. [11].HCAI Technology Innovation Programme Showcase Hospitals report number 5. The Flexi-Seal® Faecal Management System. http://hcai.dh.gov.uk/files/2011/03/Evaluation_Report_Flexi_seal_faecal_management_system_HCAI_technologies_Dec09.pdf. Lastet ned november 2011.

Ønsker du å få vite mer, kontakt:
ConvaTec kundeservice på tlf.: 800 30 995
e-mail: convatec.kundeservice@convatec.com

ConvaTec Norway AS • Postboks 6464 Etterstad • 0605 Oslo • Tlf. 800 30 995 • **www.convatec.no**

ConvaTec