

Versiva[®] **XC**[™]
Apósito de Espuma Gelificante



GUÍA DE APLICACIÓN


Guía de aplicación*

Uso del apósito Versiva®XC™ en heridas superficiales

Esta guía se ofrece para asistir a los profesionales sanitarios en el tratamiento de pacientes con heridas superficiales con el apósito Versiva®XC™.

- Asegúrese que elige la forma de apósito que se adapta a la localización anatómica de la herida. Por ejemplo, cuadrado, sacro o para el talón.
- Elija el tamaño y forma de apósito que sea suficiente para que la capa absorbente cubra el lecho de la herida.
- Cuando saque el apósito del envoltorio estéril minimice el contacto de los dedos con la superficie que estará en contacto con la herida.

Cómo usar el apósito Versiva®XC™



El apósito Versiva®XC™ está diseñado para permanecer hasta un máximo de 7 días aplicado en la herida. Controle la herida y el apósito durante los primeros 7-10 días para vigilar el creciente flujo de exudado y cambie los apósitos cuando sea necesario.

Guía de aplicación*

Uso del apósito Versiva®XC™ conjuntamente con los apósitos AQUACEL® o AQUACEL® Ag en heridas planas

- Si el apósito Versiva®XC™ se usa como apósito primario y se producen altos volúmenes de exudado o hay un incremento de los niveles de exudado, sería beneficioso usarlo conjuntamente con el apósito AQUACEL® para manejar el exudado.
- Use el apósito Versiva®XC™ combinado con el apósito AQUACEL®Ag en heridas infectadas o con riesgo de infección.
- Elija el tamaño y forma del apósito adecuado para que la capa absorbente cubra el lecho de la herida.
- Cuando saque el apósito del envoltorio estéril minimice el contacto de los dedos con la superficie en contacto con la herida.



Uso del apósito Versiva®XC™ conjuntamente con el apósito AQUACEL® o AQUACEL®Ag en heridas cavitadas

- Si el apósito Versiva®XC™ se usa como apósito primario y se producen altos volúmenes de exudado o hay un incremento de los niveles de exudado, sería beneficio so usarlo conjuntamente con el apósito AQUACEL® para manejar el exudado.
- Use el apósito Versiva®XC™ combinado con el apósito AQUACEL®Ag en heridas infectadas o con riesgo de infección.
- Elija el tamaño y forma de apósito que adecuado para que la capa absorbente cubra el lecho de la herida.
- Cuando saque el apósito del envoltorio estéril, evite el contacto de los dedos con la superficie que estará en contacto con la herida.

Cómo usar el apósito Versiva®XC™ combinado con el apósito AQUACEL®



Asegúrese que la herida y la piel perilesional están limpias. Limpie con un agente de limpieza adecuado o con solución salina normal y seque el área alrededor de la herida.



Seleccione el tamaño de apósito apropiado, asegurándose que el área absorbente cubre completamente el lecho de la herida.



Coloque el apósito AQUACEL® en la herida, alineando el centro del apósito con el centro de la herida.



Cuando empiece a aplicar el apósito Versiva®XC™, alinee el centro de la capa absorbente con el centro de la herida.




Los apósitos adhesivos se fijarán en la piel perilesional. Fije los no adhesivos con un vendaje apropiado o esparadrapo.



Aplicación del apósito Versiva®XC™.*



Asegúrese que la herida y la piel perilesional están limpias. Limpie con un agente de limpieza adecuado o con solución salina normal y seque el área alrededor de la herida.



Inserte el apósito AQUACEL® en formato cinta en el interior de la herida, rellene un 80% de la cavidad. El apósito se expandirá en contacto con el exudado. Deje como mínimo 2,5cm de cinta en el exterior de la herida para una fácil retirada.



Seleccione el tamaño apropiado del apósito Versiva®XC™, asegurándose que el área absorbente cubre el lecho de la herida completamente.



Cuando empiece a aplicar el apósito Versiva®XC™, alinee el centro de la capa absorbente con el centro de la herida. Los apósitos adhesivos se fijarán en la piel perilesional. Fije los no adhesivos con un vendaje apropiado o esparadrapo.



Aplicación del apósito Versiva®XC™.*

*

El apósito Versiva®XC™ está diseñado para permanecer aplicado en la herida hasta un máximo de 7 días. Controle la herida y el apósito durante los primeros 7-10 días para vigilar el creciente flujo de exudado y cambie los apósitos cuando sea necesario.

Cómo usar el apósito Versiva®XC™ combinado con el apósito AQUACEL® Ag



1
Asegúrese que la herida y la piel perilesional están limpias. Limpie con un agente de limpieza adecuado o con solución salina normal y seque el área alrededor de la herida.



2
Seleccione el tamaño de apósito apropiado, asegurándose que el área absorbente cubre completamente el lecho de la herida.



3
Coloque el apósito AQUACEL®Ag en la herida, alineando el centro del apósito con el centro de la herida.



4
Cuando empiece a aplicar el apósito Versiva®XC™ alinee el centro de la capa absorbente con el centro de la herida.




5
Los apósitos adhesivos se fijarán en la piel perilesional. Fije los no adhesivos con un vendaje apropiado o esparadrapo.



6
Controle la herida y el apósito durante los primeros 7-10 días para vigilar el creciente flujo de exudado y cambie los apósitos cuando sea necesario.



1
Asegúrese que la herida y la piel perilesional están limpias. Limpie con un agente de limpieza adecuado o con solución salina normal y seque el área alrededor de la herida.




2
Inserte el apósito AQUACEL®Ag en formato cinta en el interior de la herida cavitada, rellene un 80% de la cavidad. En contacto con el exudado el apósito se expandirá. Deje por lo menos 2,5 cm de cinta en el exterior de la herida para una fácil retirada.



3
Seleccione el tamaño y la forma del apósito Versiva®XC™ apropiado, asegurándose que el área absorbente cubre el lecho de la herida entero.



4
Cuando empiece a aplicar el Apósito Versiva®XC™ alinee el centro de la capa absorbente con el centro de la herida. Los apósitos adhesivos se fijarán en la piel perilesional. Fije los no adhesivos con un vendaje apropiado o esparadrapo.



5
Aplicación del apósito Versiva®XC™.*

*
El apósito Versiva®XC™ está diseñado para permanecer aplicado en la herida hasta un máximo de 7 días. Controle la herida y el apósito durante los primeros 7-10 días para vigilar el creciente flujo de exudado y cambie los apósitos cuando sea necesario.

Consejos y sugerencias para el apósito Versiva®XC™

Elegir un apósito

- Asegúrese que elige la forma de apósito que mejor se adapte a la localización anatómica de la herida. Por ejemplo; cuadrado, sacro o talón.

Tamaño del apósito

- Elija: el tamaño y forma de apósito que sea suficiente para que la capa absorbente cubra el lecho de la herida.

Controle el flujo del exudado

- Los apósitos pueden permanecer aplicados hasta 7 días. Se puede experimentar un incremento del flujo del exudado durante los primeros 7-10 días desde el inicio del tratamiento de la herida con el apósito Versiva®XC™.
- Durante este periodo los apósitos se deberán vigilar de cerca y ser cambiados cuando sea necesario.

Heridas con exudado abundante

- Si el apósito Versiva®XC™ se usa como apósito primario y se producen altos volúmenes de exudado o hay un incremento en los niveles de exudado, sería beneficioso usarlo conjuntamente con el apósito AQUACEL® o AQUACEL®Ag para manejar el exudado.

¿Cicatrización o maceración?


- Es importante no confundir la epitelización con la maceración en el uso del apósito Versiva®XC™.
- Un borde blanco y uniforme en el interior del margen de la herida es más posible que sea tejido neoformado que maceración, la cual acostumbra a presentarse como tejido empapado en el punto más bajo de la herida.



Aplicación en el talón (Adhesivo)



Aplicación en la pierna (No adhesivo)



Aplicación en el sacro
(Adhesivo)



Corte para dar forma para su aplicación
en el dedo del pie (No adhesivo)

Una cura versátil y efectiva de ConvaTec

El apósito Versiva®XC™ está disponible en una amplia gama de formatos, incluyendo No Adhesivo y Adhesivo, también en forma sacra y talón (mostrados en la zona superior).
El apósito Versiva®XC™ se puede cortar de cualquier forma o tamaño sin perder los beneficios de la Tecnología Hydrofiber®.

AP-008672-ES
V XC9605

InfoTec
(900 30 40 50)
infotec@convatec.com