convatec
— forever caring —

Produktübersicht

Wundversorgung
Advanced Wound Care

Gültig ab März 2025

Inhaltsverzeichnis

Wundmanagement

5 Herzlich willkommen

7 Wofür wir stehen

8 Convatec Innovationsreise

10 Wundhygiene

12 Hinweise zur erfolgreichen Wundbehandlung

13 6 Schritte zur Wundbeurteilung und Wunddokumentation

14 Phasengerechte Wundbehandlung

16 Hydrofiber® Technologie

17 MEHR ALS SILBER™ Technologie

18 Convatec Produktfinder

Produktübersicht

Hydrofiber®

22 AQUACEL® Extra Wundauflage

22 AQUACEL® Tamponade

Hydrofiber®, antimikrobiell mit Silber

24 AQUACEL® Ag+ Extra Wundauflage

24 AQUACEL® Ag+ Tamponade

42 AQUACEL® Ag Burn Wundauflage

Schaumstoffverbände

26 Neu ConvaFoam® Silicone
ConvaFoam® Border
ConvaFoam® nicht-adhäsiv

30 FoamLite™ ConvaTec adhäsiv

Schaumstoffverbände, antimikrobiell mit Silber

28 AQUACEL® Ag Foam adhäsiv

28 AQUACEL® Ag Foam nicht adhäsiv

Superabsorber Wundverbände

32 ConvaMax™ adhäsiv

32 ConvaMax™ nicht-adhäsiv

Hydrokolloid Wundverbände

34 VARIHESIVE® E

34 VARIHESIVE® E Border

36 VARIHESIVE® Extra dünn

Alginate

38 KALTOSTAT® Wundauflage

38 KALTOSTAT® Tamponade

Wundverbände mit Aktivkohle, geruchsneutralisierend

40 CarboFlex® Wundauflage

Postoperative Wundverbände

44 AQUACEL® Surgical adhäsiv

44 AQUACEL® Ag Surgical adhäsiv

Hydrogele

46 VARIHESIVE® Hydrogel®

Unterdruck Wundtherapie (NPWT)

48 Avelle™ Pumpe

48 Avelle™ Wundverbände

Hautschutz & Pflasterlöser

50 ESENTA™ Reizfreier Hautschutz-Applikator

50 ESENTA™ Reizfreies Hautschutz-Spray

50 ESENTA™ Reizfreie Hautschutz-Tücher

51 ESENTA™ Pflasterentferner-Spray

51 ESENTA™ Pflasterentferner-Tücher

Herzlich willkommen

Convatec ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Vermarktung von Medizinprodukten und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen. In den Bereichen phasengerechte Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenzversorgung, Intensivmedizin sowie Infusionstechnik weist Convatec führende Marktpositionen auf. Wir unterstützen medizinisches Fachpersonal auf allen Ebenen – von der Klinik über den niedergelassenen Bereich bis hin zu Pflege- und Gesundheitseinrichtungen auf Gemeindeebene.

Convatec beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter und ist in über 100 Ländern aktiv. Seit 2016 ist Convatec an der Londoner Börse notiert.

Seit der Gründung vor über 50 Jahren entwickelt Convatec innovative Produkte und bietet produktbezogene Dienstleistungen an, die das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verbessern. Unsere Werte reflektieren unsere tägliche Arbeit und bilden die Grundlage für unsere Unternehmensentwicklung und unser Wachstum.

Wir engagieren uns für hervorragende Leistungen in allem, was wir tun. Unser Ziel ist es, mit fortschrittlichen Technologien und branchenführenden Produkten sowie Services, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Wir gewinnen Vertrauen, indem wir qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, auf die sich unsere Kunden verlassen können.

Im Bereich der phasengerechten Wundversorgung treibt Convatec die Wissenschaft der Wundbehandlung und -heilung akuter und chronischer Wunden stetig voran. Von unseren Anfängen als Pionier in der phasengerechten Wundversorgung – mit dem ersten Hydrokolloid Verband der Welt: VARIHESIVE® – unterstützen wir bis heute medizinisches Fachpersonal weltweit mit innovativen und zuverlässigen Wundversorgungsprodukten.

„Forever caring“ Unser Versprechen an Sie!

Mit unserem Versprechen „forever caring“ verpflichten wir uns zu dauerhafter Fürsorge. Dies bedeutet, medizinisches Fach- und Pflegepersonal jetzt und in Zukunft bestmöglich zu unterstützen – ebenso wie die Menschen, um die sie sich kümmern.

Unsere Mission: Lebensqualität fördern

Das Versprechen, das wir Ihnen geben, klingt einfach, ist aber vielschichtig: Forever caring – wir kümmern uns um Sie, solange Sie uns brauchen – individuell und einfühlsam. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und begleiten Sie langfristig, zuverlässig und mit passenden medizinischen Lösungen.

Bedarfsorientierte Technologie

Unser Versprechen bedeutet auch: Wir stellen hochqualitative medizinische Lösungen für die Zukunft bereit, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei vereinen wir unsere Services und Produkte mit dem Lebensstil unserer Patient:innen.

Unterstützung durch Erfahrung

Wir wissen genau, vor welchen Herausforderungen Sie täglich stehen. Zuwendung, Zeit, Patientensicherheit und Menschlichkeit stehen für uns im Fokus. Convatec vereint dafür vielseitige Anwendungsoptionen und hervorragende Lösungsansätze unter einem Dach.

Innovation

Wir sind immer für Sie da. Ihre Bedürfnisse und Fragen stehen im Vordergrund. Wir hören unseren Patient:innen und Kund:innen zu und gehen durch innovative Lösungen genau auf ihre persönlichen Herausforderungen ein – mit der idealen Kombination aus Fürsorge und innovativer Technologie.

Innovationsreise

Convatec Advanced Wound Care

VariHesive®

Weltweit erster Hydrokolloidverband für ein feuchtes Wundheilungsmilieu und Förderung des Heilungsprozesses

1982

1988

Einführung der Calcium-Natriumalginat-Wundauflage mit blutstillender Wirkung

KALTOSTAT®

AQUACEL®

Erste Wundauflage mit patentierter Hydrofiber® Technologie für eine optimale Feuchtigkeitsbalance und verlässlichen Wundrandschutz

1996

1998

Geruchsneutralisierende Wundauflage mit Aktivkohle

CarboFlex®

AQUACEL® Ag

Patentierte Hydrofiber® Technologie kombiniert mit der antimikrobiellen Wirksamkeit von Silberionen zur effektiven Infektionsbekämpfung

2003

AQUACEL® Surgical

Aquacel® Ag Surgical

Neue Kombination von Hydrokolloid und Hydrofiber® Technologie für die postoperative Wundversorgung

2011



FoamLite ConvaTec

Dünner Schaumverband mit atmungsaktivem Schutzfilm und hautfreundlicher Silikonhaftfläche

2016



2014

Antimikrobielle silberhaltige Hydrofiber® Wundauflage mit der MEHR ALS SILBER™ Technologie

Aquacel® Ag+ Extra

SENSI CARE SENSI CARE

Pflasterlöser, Pflasterentferner und Hautschutz

2013

Aquacel® Ag Foam

Antimikrobiell wirkender Silberschaum-verband mit Hydrofiber® Wundkontaktschicht

2013

2013

Für die Behandlung von Verbrennungen ersten und zweiten Grades sowie für die Versorgung von Spalthautentnahmestellen

AQUACEL® Ag Burn

AQUACEL® Extra AQUACEL® Ag Extra

Verbesserung der Reißfestigkeit und Aufnahmekapazität durch Verwebung von Verstärkungsfasern

2012



2012

Schaumverband mit Hydrofiber® Technologie für einen verlässlichen Wundrandschutz

AQUACEL® Foam

Avelle™

Erstes Unterdruck-Wundtherapie (NPWT-) System mit Hydrofiber® Technologie

2017

2019

Superabsorber für ein effektives Management von großen Exsudatmengen

ConvaMax™ Superabsorber

AQUACEL® Foam Pro

Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Hydrofiber® Technologie

2021

ESENTA™

Optimierter Pflasterentferner und Hautschutz vereint in neuer Marke

2022

2024

Zuschneidbarer Silikon-Schaumverband

ConvaFoam® Silicone

2025

Schaumverband mit überlegenem Exsudatmanagement und Wundrandschutz

ConvaFoam® Border

ConvaFoam® Non-adhesive

Wundhygiene

In vier einfachen Schritten zur optimalen Wundversorgung

Wundhygiene

Wenn eine Wunde chronisch ist oder schlecht heilt, ist die Unterbrechung des Heilungsprozesses häufig auf das Vorhandensein eines hartnäckigen Biofilms zurückzuführen. Durch die Anwendung der vier Schritte der Wundhygiene können Sie bei jedem Verbandwechsel sicherstellen, dass die Wunde optimal auf die Heilung vorbereitet wird.

Biofilmbasierte Wundversorgung:
Neu gedacht, einfach gemacht!

Umsetzung der Wundhygiene in Ihrem Praxisalltag



1 Spülung & Reinigung

Reinigung des Wundbetts und der Wundumgebung mit einer geeigneten Wundspüllösung. Entfernung von losem Material. Dekontamination mit einem geeigneten Antiseptikum bei Vorliegen einer Wundinfektion.

2 Débridement

Entfernung von nekrotischem Gewebe, Belägen, Zelltrümmern und Biofilm bei jedem Verbandwechsel. In Abgrenzung zur Spülung und Reinigung wird hierbei festsitzendes Material gelöst und abgetragen.

3 Wundrandbehandlung

Beseitigung von Strukturen, die Biofilm beherbergen können, wie Schorf, Beläge und Hyperkeratosen am Wundrand. Ziel ist es, das Niveau der Wundränder an den Wundgrund anzugleichen, um das Voranschreiten der Epithelisierung und die Wundkontraktion zu unterstützen.

4 Wundverband

Wahl des Wundverbands gemäß aktueller Wundheilungsphase, der Exsudatmenge sowie einer möglichen Keimbesiedelung der Wunde. Um Infektionen zu bekämpfen und um die Neubildung von Biofilm zu verhindern können antimikrobielle Wundverbände eingesetzt werden.

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie auf der Wundhygiene Website:
woundhygiene.com/de/

Diese vier Schritte sollten regelmäßig und häufig wiederholt werden, um:

1. **Ein gesundes Heilungsumfeld zu fördern und zu erhalten**
2. **Den hartnäckigen Biofilm anzugehen, der in der Mehrzahl der chronischen und stagnierenden Wunden vorhanden ist**

- Alle Wunden, insbesondere chronische und schlecht heilende Wunden, profitieren vom Konzept der Wundhygiene
- Die Wundhygiene kann von medizinischen Fachkräften im stationären und ambulanten Umfeld durchgeführt werden
- Die vier Schritte können auf die Bedürfnisse der Patient:innen und die Anforderungen der Wunde angepasst werden
- Die Ziele der Wundhygiene sind bessere Heilungsraten, ein verringerter Einsatz von Antibiotika und eine Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Patient:innen

Hinweise
zur erfolgreichen Wundbehandlung

Diagnostik und Therapie der Grunderkrankung

Voraussetzung für die Wundheilung ist eine gute Durchblutung des Gewebes. Ist die arterielle und / oder venöse Durchblutung gestört, führt dies zu einer Mangelversorgung des Gewebes.

Vorrangig ist die Ursache der Wundentstehung zu erkennen und zu behandeln:

- **Revaskularisierung bei arterieller Durchblutungsstörung**
- **Kompressionstherapie bei chronischer Veneninsuffizienz**
- **Druckentlastung bei Dekubitus und neuropathischen Ulcera**

Grunderkrankungen, wie Diabetes mellitus, die die Wundheilung beeinflussen, müssen zusätzlich behandelt werden.

Wundbeurteilung

Um unsere Wundprodukte gezielt einsetzen zu können, bedarf es einer systematischen Wundbeurteilung. Voraussetzung dafür ist, dass alle beteiligten Personen in der Behandlung von akuten und chronischen Wunden dieselbe Sprache sprechen und Wunden nach einheitlichen Kriterien beurteilen.

Erfüllung der individuellen Bedürfnisse der Wunde – gezielter Einsatz von Wundverbänden

Für eine erfolgreiche Wundheilung benötigt die Wunde Feuchtigkeit, Wärme und ein bakterienarmes Milieu. Der Einsatz unserer Wundversorgungsprodukte sollte individuell an die Gegebenheiten und Bedürfnisse der Wunde angepasst werden. Entscheidend sind die vorherrschende Wundheilungsphase, die Exsudatmenge und die Keimbesiedelung der Wunde.

Convatec Advanced Wound Care bietet innovative Wundverbände, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen mit akuten und chronischen Wunden zu verbessern.

6 Schritte
zur Wundbeurteilung und Wunddokumentation

1. Die Wundheilung beeinflussende Faktoren beachten und erfassen

- Systemische Faktoren: Grunderkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, chronische Veneninsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit), Nebendiagnosen, Immunstatus, Wundheilungsverlauf, Medikamente, Ernährung, Mobilität, Alter, psychosoziale Aspekte, Patientenadhärenz, Rauchen/Drogenmissbrauch
- Lokale Faktoren: Lokalisation der Wunde, Durchblutung des Wundgebietes, Exsudatmenge, Temperatur der Wunde, Fremdkörper, Wundursache bzw. Art der Entstehung (z.B. Riss- oder Quetschwunden, Pfählungsverletzungen, (Ketten-)Sägenunfälle etc.)

2. Den entfernten Verband beurteilen

- Exsudatmenge
- Exsudatbeschaffenheit
- Verbandwechselintervall

3. Wundreinigung durchführen

- Mechanische Wundreinigung, chirurgisches Débridement
- Auswahl der geeigneten Wundspülflüssigkeit, bei Bedarf Einsatz von Antiseptika

4. Wundstatus erheben

- Lokalisation der Wunde
- Klassifikation / Kategorisierung der Wunde
- Angabe der Wundgröße (Länge, Breite, Tiefe)
- Gegebenenfalls Beschreibung von Unterminierungen, Taschen, Fisteln (Länge, Ausrichtung)
- Bestimmung der Wundheilungsphase (Exsudations-, Granulations-, Epithelisierungsphase)
- Erfassung von Besonderheiten der Wundbeschaffenheit und des Wundgrunds (z. B. Nekrose, Fibrin, Wundgeruch)
- Beurteilung von Wundrand und Wundumgebung
- Untersuchung auf Infektionszeichen
- Bestimmung der Bakteriologie (aseptische Wunde, Kontamination, Kolonisation, kritische Kolonisation, Infektion, Biofilm)

5. Wundschmerzen beurteilen und behandeln

- Erfassung von Häufigkeit, Intensität und Ursache
- Einsatz von Instrumenten zur Schmerzerfassung, z. B. Visuelle Analog Skala (VAS), Numerische Rating Skala (NRS), ggf. Schmerztagebuch

6. Wunddokumentation durchführen

- Wunddokumentationsbogen
- Fotodokumentation

Phasengerechte Wundbehandlung

Der Wundheilungsprozess lässt sich in drei Phasen einteilen:

1. Exsudationsphase (Inflammationsphase)

Inflammatorische oder exsudative Phase, in der hauptsächlich die Reinigung der Wunde stattfindet

2. Granulationsphase (Proliferationsphase)

Proliferative Phase zum Aufbau von neuem Gewebe

3. Epithelisierungsphase (Regenerationsphase)

Regenerative Phase zur Bildung einer neuen Hautschicht – später Differenzierung, Ausreifung und Narbenbildung

Phasen der Wundheilung



Exsudationsphase (Inflammationsphase)

Wundreinigung,
Abbau von zerstörtem Gewebe

Ziele

- Entfernung von avitalem Gewebe (z. B. Nekrosen, Beläge)
- Adäquates Exsudatmanagement
- Schutz der wundumgebenden Haut

Maßnahmen

- Durchführung eines Débridements und einer effektiven mechanischen Wundreinigung
- Einsatz von absorbierenden Verbänden mit hohem Retentionsvermögen
- Durchführung regelmäßiger Verbandwechsel



Granulationsphase (Proliferationsphase)

Beginn der Gefäßneubildung und
Aufbau von Granulationsgewebe

Ziele

- Schaffung und Erhaltung eines physiologischen (feucht-warmen) Wundmilieus, um das Zellwachstum zu fördern
- Schutz des neu gebildeten Gewebes

Maßnahmen

- Einsatz von hydroaktiven Verbänden
- Gewährleistung der Wundruhe
- Durchführung von Verbandwechsel, wenn angezeigt



Epithelisierungsphase (Regenerationsphase)

Bildung der Epithelschicht vom Wundrand zur Mitte, Beginn der Vernarbungsprozesse

Ziele

- Förderung der Zellwanderung und -teilung von Hautzellen
- Mechanischer Schutz des Epithels der Wunde und der Wundumgebung

Maßnahmen

- Einsatz von dünnen, schützenden Wundverbänden
- Einhaltung langer Verbandwechselintervalle

Hydrofiber® Technologie

Die patentierte Hydrofiber® Technologie von Convatec basiert auf reiner Cellulose, die chemisch zu Natriumcarboxymethylcellulose weiterverarbeitet wird. Wundverbände mit Hydrofiber® Technologie verfügen über eine hohe Aufnahmekapazität sowie ein hohes Retentionsvermögen. Darüber hinaus bilden sie bei Kontakt mit Wundexsudat ein formstabiles Gel.

Diese Eigenschaften sorgen für ein optimales Exsudatmanagement.

Die Hydrofiber® Technologie bildet die Basis für die AQUACEL® Wundverbände von Convatec, die hinsichtlich Exsudatmanagement und Infektionskontrolle einzigartig sind.

Das einzigartige Wirkprinzip der Hydrofiber® Technologie



Schließt Wundexsudat, das Enzyme und Bakterien enthält, ein.[1–4] Verringert die laterale Ausbreitung zur Vermeidung von Mazeration der umgebenden Haut.*[5,6]

Passt sich dem Wundbett exakt an[7], hilft dabei eine optimale Feuchtigkeitsbalance in der Wunde aufrechtzuerhalten[8] und eliminiert unversorgte Bereiche, in denen sich Bakterien vermehren können.[7,9]

Reagiert auf das Wundmilieu durch Bildung eines formstabilen Gels* und ermöglicht einen schmerzarmen Verbandwechsel.[10,11]

Referenzen: 1. Newman GR, Walker M, Hobot JA et al. Visualisation of bacteria sequestration and bacterial activity within hydrating Hydrofiber® wound dressings. Biomaterials 2006; 27(7): 1129-39 **2.** Walker M, Hobot J, Newman G et al. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL®) and alginate Dressing. Biomaterials 2003; 24(5): 883-90 **3.** Bowler P, Jones S, Davies B et al. Infection control properties of some wound dressings. J Wound Care 1999; 8(10):499-502 **4.** Walker M, Bowler P, Cochraneá C. In vitro studies to show sequestration of matrix metalloproteinases by silver-containing wound care products. Ostomy Wound Manage 1999; 53(9): 18-25 **5.** Walker M, Parsons D. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. Wounds UK 2010; 6: 31-8 **6.** Parsons D, Bowler PG, Myles V, et al. Silver antimicrobial dressings in wound management: A comparison of antibacterial, physical and chemical characteristics. WOUNDS 2005; 17: 222-32 **7.** Jones S, Bowler P, Walker M. Antimicrobial activity of silvercontaining dressings is influenced by dressing conformability with a wound surface. WOUNDS 2005 17: 263-70 **8.** Bishop S, Walker M, Rogers A et al. Moisture balance: optimising the wound-dressing interface. J Wound Care 2003; 12: 125-8, 13 **9.** Bowler P, Jones S, Towers V et al. Dressing conformability and silvercontaining wound dressings. Wounds UK 2010; 6(2): 14-20 **10.** Barnea Y, Amir A, Leshem D et al. Clinical comparative study of Aquacel and paraffi n gauze dressing for splitskin donor site treatment. Ann Plast Surg 2004; 53(2): 132-6 **11.** Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S et al. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters 2004; 17(4): 201-7

* In vitro belegt

MEHR ALS SILBER™ Technologie

Biofilm ist nachweislich in einer Vielzahl von chronischen Wunden vorhanden und stellt einen der Hauptgründe für eine verzögerte Wundheilung und eine Vorstufe von Infektionen dar.[12–14] Biofilm setzt sich aus mikrobiellen Zellen zusammen, die sich eingebettet in einer durch sie selbst gebildeten Matrix aus extrazellulärer polymerer Substanz (EPS) an lebende oder nicht lebende Oberflächen anhaften.[17,18]

Es ist schwierig, Biofilm vollständig zu entfernen – selbst mittels Débridement. Zudem bildet er sich schnell wieder neu.[15] Biofilm ist tolerant gegenüber Antiseptika und Antibiotika und ist in der Lage, die körpereigene Immunabwehr zu umgehen.[14,16]

Die MEHR ALS SILBER™ Technologie ist eine einzigartige silberhaltige Formel, die in der Lage ist, Biofilm zu durchbrechen, Bakterien schnell abzutöten und den Wiederaufbau des Biofilms zu verhindern.[19-21]

Die Zusammensetzung und Wirkweise der MEHR ALS SILBER™ Technologie



EDTA (Ethylendiamintetraacetat)

Metallchelatbildner, der den Biofilm durchbricht

→ Bricht den Biofilm auf, um die Bakterien darin freizulegen

→ Befördert die Silberionen geschützt an ihren Wirkungsort

Benzethoniumchlorid

Tensid, das die Oberflächenspannung im Biofilm vermindert

Dies ermöglicht:

→ Eine schnellere Aufnahme von Exsudat in den Wundverband

→ Eine höhere Mobilität von Silber und EDTA innerhalb des Exsudats, was wiederum die Fähigkeit maximiert, den Biofilm aufzubrechen und Bakterien abzutöten

Ionisches Silber

→ **Mit antimikrobieller Wirksamkeit** gegen Bakterien töten Silberionen sowohl freischwimmende Bakterien als auch aus dem Biofilm freigesetzte Bakterien ab

→ **Verhindert den Wiederaufbau** von Biofilm

Referenzen: 12. James GA, Swogger E, Wolcott R, Pulcini EL, Secor P, Sestrich J, et al, 2008. Biofilms in Chronic Wounds. Wound Rep Regen; 16: 37-44. **13.** Metcalf D, Bowler P, 2013. Biofilm delays wound healing: A review of the evidence. Burns & Trauma. 1: 5-12. **14.** Percival SL, Bowler PG, 2004. Biofilms and their potential role in wound healing. WOUNDS, 16: 234-240. **15.** Wolcott RD, Rumbaugh KP, James G, Schultz G, Phillips P, Yang O, et al, 2010. Biofilm maturity studies indicate sharp debridement opens a time-dependent therapeutic window. J Wound Care; 19: 320-328. **16.** Bowler. Antibiotic resistance and biofilm tolerance: a combined threat in the treatment of chronic infections. JWC Vol 27;No 5; 2018. **17.** Gurjala AN, Geringer MR, Seth AK, Hong SJ, Smeltzer MS, Galiano RA, et al, 2011. Development of a novel, highly quantitative in vivo model for the study of biofilm-impaired cutaneous wound healing. Wound Rep Reg. 19: 400-410. **18.** Hall-Stoodley L I et al. Towards diagnostic guidelines for biofilm-associated infections. FEMS Immunol Med Microbiol. 2012; 65:127–145. **19.** Parsons D, Meredith K, Rowlands VJ et al. Enhanced Performance and Mode of Action of a Novel Antibiofilm Hydrofiber® Wound Dressing. BioMed Res Int 2016; ID: 7616471 **20.** Parsons D. Designing a dressing to address local barriers to wound healing, in: Next-Generation Antimicrobial Dressings: AQUACEL™ Ag+ Extra™ and Ribbon. Wounds International, London, UK. 2014. Available at: http://www.woundsinternational.com (accessed 21.04.17) **21.** Bowler PG, Parsons D. Combatting wound biofilm and recalcitrance with a novel anti-biofilm Hydrofiber® wound dressing. Wound Medicine 2016; 14: 6–11

Immer die richtige Wahl

Convatec Wundversorgungsprodukte

Für eine erfolgreiche Wundheilung benötigt die Wunde Feuchtigkeit, Wärme und ein bakterienarmes Milieu.

Der Einsatz von Wundversorgungsprodukten sollte individuell an die Gegebenheiten und Bedürfnisse der Wunde angepasst sein.

Entscheidend für die bestmögliche Auswahl sind die vorherrschende Wundheilungsphase, die Exsudatmenge sowie die Keimbesiedlung der Wunde.

Bakteriologie	Wundheilungsphase	Wundbeispiel	Exsudatmenge
Keimarme Wunde	Exsudation (Inflammation)		💧💧💧💧 / 💧💧💧 / 💧💧
	Granulation (Proliferation)		💧💧💧 / 💧💧 / 💧
	Epithelisierung (Regeneration)		💧 / ⛒
Infektionsgefährdete / infizierte Wunde	Exsudation (Inflammation)		💧💧💧💧 / 💧💧💧 / 💧💧

Weitere Indikationen:

- Blutende Wunde
- Stagnierende Wunde
- Riechende Wunde
- Chirurgische Wunde
- Hautschutz / Pflasterentferner
- Verbrennungswunden 2a/2b

💧💧💧💧 sehr viel Exsudat 💧💧💧 viel Exsudat 💧💧 mäßig Exsudat 💧 wenig Exsudat ⛒ kein Exsudat

Oberflächliche Wunden	Tiefere Wunden
ConvaMax™ SUPERABSORBER	AQUACEL Extra + ConvaMax™ SUPERABSORBER
ConvaFoam®	AQUACEL Extra + ConvaFoam®
ConvaFoam® / FoamLite ConvaTec	
Aquacel® Ag+ Extra + ConvaMax™ SUPERABSORBER	
Aquacel® Ag Foam	Aquacel® Ag+ Extra + ConvaFoam®

Primärverband	Sekundärverband
KALTOSTAT®	ConvaFoam®
Avelle / Aquacel® Ag+ Extra	Avelle
CarboFlex®	
AQUACEL Surgical / Aquacel® Ag Surgical	Avelle
ESENTA™	
AQUACEL Ag Burn	

Produktübersicht

AQUACEL® Extra™

Hydrofiber® Wundauflage mit hoher Aufnahme-kapazität für einen sicheren Exsudat-Einschluss

❶ 100 % Natriumcarboxymethylcellulose

- Hohe Aufnahmekapazität für weniger Verbandwechsel
- Extra Reißfestigkeit durch eingearbeitete Verstärkungsfasern für eine einfache Entfernung

Art des Wundverbandes
Primärverband, Wundfüller

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation)

Exsudat
mäßig bis viel

Bakteriologie
keimarme Wunde

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

Indikation

AQUACEL® Extra eignet sich für die Versorgung von akuten und chronischen, mäßig bis stark exsudierenden Wunden, z. B.:

- Ulcus cruris venosum
- Ulcus cruris arteriosum
- Dekubitus
- Diabetische Fußulcera
- Chirurgische Wunden
- Traumatische Wunden

Produktnutzen

Basierend auf der Hydrofiber® Technologie für die Behandlung von exsudierenden Wunden:

Passt sich dem Wundbett exakt an und eliminiert unversorgte Bereiche (Toträume), in denen Bakterien und Biofilm wachsen können

Schließt überschüssiges Exsudat ein, schützt die intakte Wundumgebung und verhindert Mazerationen durch vertikale Flüssigkeitsaufnahme

Sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsbalance in der Wunde, um ein feucht-warmes Wundheilungsmilieu aufrechtzuerhalten, während das Gel zu einer Minimierung der Schmerzen beim Verbandwechsel beiträgt

Weich, anpassungsfähig und saugstark

Zuschneidbar

Effektiv auch unter Kompression

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Unterstützt das autolytische Débridement

Stark auch in feuchtem Zustand

Kann gefaltet werden, um sich an jede Wunde anzupassen

Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage

Anwendung

AQUACEL® Extra mindestens 2,5 cm aus der Wundhöhle herausragen lassen, um das Entfernen beim Verbandwechsel zu erleichtern.



Tiefe Wunden nur zu 80 % mit AQUACEL® Extra füllen, um die Ausdehnung der Hydrofiber® in Verbindung mit Wundexsudat zu ermöglichen.

Für einen verlässlichen Wundrandschutz sollte AQUACEL® Extra die Wundränder um mindestens 1 cm überlappen.

Verordnungsinformation AQUACEL® Extra

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
Wundauflage			
5 × 5 cm	10 Stück	420 671	**090 788 31**
5 × 10 cm	10 Stück	420 825	–
10 × 10 cm	10 Stück	420 672	**090 788 48**
15 × 15 cm	5 Stück	420 673	**090 788 54**
20 × 24 cm	5 Stück	–	**172 844 21**
4 × 10 cm	10 Stück	420 820	**087 465 90**
4 × 20 cm	10 Stück	420 821	**087 466 15**
4 × 30 cm	10 Stück	420 822	**087 466 21**
Tamponade			
1 × 45 cm	5 Stück	420 127	**065 854 38**
2 × 45 cm	5 Stück	403 770	**072 522 88**

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

Aquacel® Ag+ Extra

Antimikrobielle silberhaltige Hydrofiber® Wundauflage, die Biofilm zerstört, Bakterien abtötet und den Wiederaufbau des Biofilms verhindert



1. 100 % Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2 % Silberionen, EDTA, Benzethoniumchlorid
   - Hohe Aufnahmekapazität für weniger Verbandwechsel
   - Extra Reißfestigkeit für eine einfache Entfernung
   - Einzigartige antimikrobielle Formel, die Bakterien abtötet und speziell gegen Biofilm wirksam ist

Art des Wundverbandes
Primärverband, Wundfüller

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation)

Exsudat
mäßig bis viel

Bakteriologie
infektionsgefährdete / infizierte Wunde

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

MEHR ALS SILBER™ Technologie
einzigartig wirksam gegen Biofilm

Indikation

Aquacel® Ag+ Extra eignet sich für die Versorgung von akuten und chronischen, mäßig bis stark exsudierenden Wunden, die Biofilm aufweisen, infiziert oder infektionsgefährdet sind:

- Ulcus cruris venosum
- Ulcus cruris arteriosum
- Dekubitus
- Diabetische Fußulcera
- Chirurgische Wunden
- Traumatische Wunden
- Maligne Wunden
- Verbrennungen zweiten Grades

Produktnutzen

- Einzigartige MEHR ALS SILBER™ Technologie durchbricht und zerstört Biofilm, tötet Bakterien schnell ab und verhindert den Wiederaufbau von Biofilm
- Passt sich dem Wundbett exakt an und eliminiert unversorgte Bereiche (Toträume), in denen Bakterien und Biofilm wachsen können
- Schließt überschüssiges Exsudat ein, schützt die intakte Wundumgebung und verhindert Mazerationen durch vertikale Flüssigkeitsaufnahme
- Sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsbalance in der Wunde, um ein feucht-warmes Wundheilungsmilieu aufrechtzuerhalten, während das Gel zu einer Minimierung der Schmerzen beim Verbandwechsel beiträgt

- **Zur Abtötung eines breiten Spektrums an Bakterien, einschließlich Antibiotika-resistenter Keime**
- **Weich, anpassungsfähig und saugstark**
- **Barriere gegen Viren und Bakterien**
- **Zuschneidbar**
- **Effektiv auch unter Kompression**
- **Einfach zu applizieren und zu entfernen**
- **Unterstützt das autolytische Débridement**
- **Stark auch in feuchtem Zustand**
- **Kann gefaltet werden, um sich an jede Wunde anzupassen**
- **Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage**

Anwendung

Aquacel® Ag+ Extra mindestens 2,5 cm aus der Wundhöhle herausragen lassen, um das Entfernen beim Verbandwechsel zu erleichtern. Aquacel® Ag+ Extra benötigt ausreichend Feuchtigkeit, damit die Silberionen im Verband ihre antimikrobielle Wirkung entfalten können.



Tiefe Wunden nur zu 80 % mit Aquacel® Ag+ Extra füllen, um die Ausdehnung der Hydrofiber® in Verbindung mit Wundexsudat zu ermöglichen.

Für einen verlässlichen Wundrandschutz sollte Aquacel® Ag+ Extra die Wundränder um mindestens 1 cm überlappen.

Verordnungsinformation Aquacel® Ag+ Extra

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
Wundauflage			
5 × 5 cm	10 Stück	413 566	102 038 56
10 × 10 cm	10 Stück	413 567	102 038 10
15 × 15 cm	5 Stück	413 568	102 038 27
20 × 30 cm	5 Stück	413 569	102 038 33
4 × 10 cm	10 Stück	413 581	102 037 44
4 × 20 cm	10 Stück	413 598	102 037 50
4 × 30 cm	10 Stück	413 599	102 037 67
Tamponade			
1 × 45 cm	5 Stück	413 570	102 037 73
2 × 45 cm	5 Stück	413 571	102 038 04

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

ConvaFoam®

Neu

Silicone

Border

Non-adhesive

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
kein bis viel

Bakteriologie
keimarme Wunde

Zuschneidbarer Schaumverband mit überlegenem Exsudatmanagement und Wundrandschutz

1. Atmungsaktiver Schutzfilm
2. Schützendes Schaumkissen
3. Superabsorber-Fasern: Schicht zur schnellen Absorption
4. Aquacel® Hydrofiber®: Schicht, die sich an das Wundbett anpasst
5. ConvaTac™ Silikon: Hautfreundliche Haftschicht

Indikation

ConvaFoam® Schaumverbände eignen sich für die Versorgung von nicht exsudierenden und exsudierenden Wunden.

ConvaFoam® ist indiziert für die Behandlung von:

- Ulcera cruris
- Dekubitus
- Diabetische Fußulzera
- Chirurgische Wunden
- Traumatische Wunden

ConvaFoam® Schaumverbände können als Primär- oder Sekundärverband und auch auf intakter Haut als Teil der Prävention von Druckverletzungen verwendet werden.

Produktnutzen

- Bietet ein überlegenes Flüssigkeitsmanagement durch eine verbesserte Aufnahmekapazität und Retention
- Reduziert die Schmerzen während des Tragens und bietet einen atraumatischen Verbandwechsel bei gleichzeitig starker, hautfreundlicher Haftung durch das neue ConvaTac™ Silikon
- Reduziert das Mazerationsrisiko der wundumgebenden Haut durch vertikale Flüssigkeitsaufnahme
- Kann Zeit und Ressourcen sparen durch weniger Verbandwechsel aufgrund der möglichen Tragedauer von 7 Tagen
- Kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten und beim Verbandwechsel repositioniert werden
- Ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Wunden geeignet - für wenig bis sehr komplexe Wunden

Weich, flexibel und anpassungsfähig

Starke, hautfreundliche Haftung

Barriere gegen Viren und Bakterien

Zuschneidbar

Effektiv auch unter Kompression

Zur Förderung der Wundheilung und zum Schutz vor Mazeration

Erhöhter Schutz für empfindliches Gewebe

Klebt weder am Handschuh noch an sich selbst

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Zum Duschen geeignet

Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

Anwendung





Wählen Sie eine angemessene Verbandgröße, sodass das zentrale Wundkissen auf allen Seiten mindestens 1 cm (1/3 Zoll) größer ist als die Wundfläche. Wenn der Verband auf intakter Haut angelegt wird, wählen Sie eine Größe, die den gesamten gefährdeten Bereich abdeckt.

Halten Sie den Verband so über die Wunde bzw. den zu schützenden Hautbereich, dass die Mitte des Verbands über dem Zentrum der Wunde bzw. des zu schützenden Hautbereichs liegt.

Stellen Sie sicher, dass der Verband beim Anbringen nicht gedehnt wird. Streichen Sie den Haftrand glatt. Stellen Sie sicher, dass an den Gelenken ausreichend Flexibilität besteht, um die Mobilität des Patienten zu gewährleisten.

Bei Bedarf können die Verbände passend zugeschnitten werden. Verwenden Sie zusätzliche Fixierstreifen oder einen Folienverband, um eine Barriere zu schaffen.

Verordnungsinformation ConvaFoam® Silicone

Größe (Wundkissen)		Packungsinhalt	REF	Original PZN
	8 × 8 (5 × 5) cm	10 Stück	423 252	172 564 94
	10 × 10 (6,5 × 6,5) cm	10 Stück	423 253	172 565 02
	15 × 15 (10 × 10) cm	5 Stück	423 908	189 000 52
Multisite	14 x 19,8 (8,7 x 14) cm	5 Stück	423 530	189 000 46
Sakral	16,5 × 20 (11,4 x 13,5) cm	5 Stück	423 257	172 565 48
Sakral	21 × 24 (13,8 x 16,4) cm	5 Stück	423 256	172 565 31

ConvaFoam® Border

Coming soon

Größe (Wundkissen)		Packungsinhalt	REF	Original PZN
	8 × 8 (5 × 5) cm	10 Stück	423 258	172 562 35
	10 × 10 (6,5 × 6,5) cm	10 Stück	423 259	172 562 41
	12,5 x 12,5 (8 x 8) cm	10 Stück	423 260	172 562 58
	17,5 x 17,5 (13 x 13) cm	5 Stück	423 916	189 000 69
	21 x 21 (15 x 15) cm	5 Stück	423 275	172 563 82
	8 x 13 (4 x 9) cm	5 Stück	423 917	189 000 81
	10 x 20 (6 x 15) cm	5 Stück	423 277	172 564 36
	10 x 25 (6 x 20) cm	5 Stück	423 918	172 564 59
	10 x 30 (6 x 25) cm	5 Stück	423 919	172 564 71
Multisite	14 x 19,8 (8,7 x 14) cm	5 Stück	423 267	189 000 75
Sakral	16,5 x 20 (11,4 x 13,8) cm	5 Stück	423 272	172 563 47
Sakral	21 x 24 (13,8 x 16,4) cm	5 Stück	423 270	172 563 24

ConvaFoam® nicht-adhäsiv

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
5 x 5 cm	10 Stück	423 354	172 565 54
10 x 10 cm	10 Stück	423 355	172 565 60
15 x 15 cm	5 Stück	423 357	172 565 77
10 x 20 cm	5 Stück	423 362	172 566 20
15 x 20 cm	5 Stück	423 363	172 566 08
20 x 20 cm	5 Stück	423 360	172 566 66

Aquacel®Ag

Foam

Antimikrobieller Schaumverband mit Silber und verlässlichem Wundrandschutz



1. Hautfreundlicher Silikonhaftrand
2. Wasserdichter, atmungsaktiver Schutzfilm (Polyurethanfilm)
3. Weicher Polyurethanschaumstoff
4. Aquacel® Ag Wundkontaktschicht (100 % Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2 % Silberionen)

Art des Wundverbandes
Primärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation)

Exsudat
mäßig

Bakteriologie
infektionsgefährdete / infizierte Wunde

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

Indikation

Aquacel® Ag Foam eignet sich für die Versorgung von akuten und chronischen, mäßig exsudierenden Wunden, die infiziert oder infektionsgefährdet sind, z. B.:

- Ulcus cruris venosum
- Ulcus cruris arteriosum
- Dekubitus
- Diabetische Fußulcera
- Chirurgische Wunden

Aquacel® Ag Foam kann bei oberflächlichen Wunden als Primärverband und ab 3 mm Wundtiefe als Sekundärverband in Kombination mit einem Wundfüller, z. B. Aquacel® Ag+ Extra, verwendet werden.

Produktnutzen

- Passt sich dem Wundbett exakt an und eliminiert unversorgte Bereiche (Toträume), in denen Bakterien und Biofilm wachsen können
- Schließt überschüssiges Exsudat ein, schützt die intakte Wundumgebung und verhindert Mazerationen durch vertikale Flüssigkeitsaufnahme
- Sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsbalance in der Wunde, um ein feucht-warmes Wundheilungsmilieu aufrechtzuerhalten, während das Gel zu einer Minimierung der Schmerzen beim Verbandwechsel beiträgt
- Reduziert Bakterien zuverlässig durch eine kontrollierte und kontinuierliche antimikrobielle Wirkung der Silberionen

Zur Abtötung eines breiten Spektrums an Bakterien, einschließlich Antibiotika-resistenter Keime

Weich, flexibel und anpassungsfähig

Barriere gegen Viren und Bakterien

Zuschneidbar

Effektiv auch unter Kompression

Klebt weder am Handschuh noch an sich selbst

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Wasserdicht / zum Duschen geeignet

Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage

Anwendung

Aquacel® Ag Foam sollte bei Einsatz als **Primärverband** für einen verlässlichen Wundrandschutz mindestens 1 cm über den Wundrand hinaus appliziert werden.

Aquacel® Ag Foam **Spezialformen** für schwierig zu versorgende Körperstellen, z. B. Sakralbereich

Verordnungsinformation Aquacel® Ag Foam

Größe (Wundkissen)		Packungsinhalt	REF	Original PZN
adhäsiv				
	8 × 8 (5,5 × 5,5) cm	10 Stück	420 805	087 465 32
	10 × 10 (7 × 7) cm	10 Stück	420 681	029 311 80
	12,5 × 12,5 (8,5 × 8,5) cm	10 Stück	420 627	090 602 39
	17,5 × 17,5 (13,5 × 13,5) cm	10 Stück	420 628	090 602 45
	21 × 21 (17 × 17) cm	5 Stück	420 629	090 602 68
	25 × 30 (19 × 24) cm	5 Stück	420 807	029 312 40
Ferse	19,8 × 14 (14 × 8,7) cm	5 Stück	420 647	090 602 80
Sakral	20 × 16,9 (13,5 × 11,4) cm	5 Stück	420 648	090 603 11
nicht-adhäsiv				
	5 × 5 cm	10 Stück	420 639	090 601 91
	10 × 10 cm	10 Stück	420 642	090 606 24
	15 × 15 cm	5 Stück	420 645	090 606 47
	15 × 20 cm	5 Stück	420 806	029 276 23
	20 × 20 cm	5 Stück	420 646	090 606 76

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

FoamLite™ ConvaTec

Dünner Schaumverband mit atmungsaktivem Schutzfilm und hautfreundlicher Silikonhaftfläche



1. Dünne, atmungsaktive Schaumstoffschicht (Polyurethan)
2. Hautfreundliche Silikonhaftfläche
3. Wasserdichter, atmungsaktiver Schutzfilm (Polyurethanfilm)

- **Weich, flexibel und anpassungsfähig**
- **Barriere gegen Viren und Bakterien**
- **Zuschneidbar**
- **Klebt weder am Handschuh noch an sich selbst**
- **Einfach zu applizieren und zu entfernen**
- **Wasserdicht / zum Duschen geeignet**
- **Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage**

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
kein bis wenig

Bakteriologie
keimarme Wunde

Indikation

FoamLite™ ConvaTec eignet sich für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden mit geringer bzw. ohne Exsudation.

Produktnutzen

- Fördert die Wundheilung durch Erhaltung eines idealen feucht-warmen Wundheilungsmilieus
- Schützt die Wunde sowie die Wundumgebung
- Unterstützt die Epithelisierung
- Bietet eine vielseitige Lösung für die alltäglichen Bedürfnisse oberflächlicher chronischer und akuter Wunden

Anwendung

FoamLite™ ConvaTec passt sich flexibel an Körperkonturen an.

FoamLite™ ConvaTec lässt sich durch seine hautfreundliche Silikonhaftfläche einfach applizieren und atraumatisch entfernen.

FoamLite™ ConvaTec ist zum Duschen geeignet.

Verordnungsinformation FoamLite™ ConvaTec

Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
5 × 5 (2,5 × 2,5) cm	10 Stück	421 927	**137 472 55**
8 × 8 (5 × 5) cm	10 Stück	421 557	**123 589 42**
10 × 10 (6,5 × 6,5) cm	10 Stück	421 559	**123 589 59**
15 × 15 (11 × 11) cm	10 Stück	421 561	**123 589 65**
5,5 × 12 (2,5 × 9,5) cm	10 Stück	421 563	**123 589 71**
10 × 20 (6,5 × 15) cm	10 Stück	421 928	**137 472 61**

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

ConvaMax™ SUPERABSORBER



Superabsorber Wundauflage mit sehr hoher Aufnahmekapazität für effektives Management übermäßigen Exsudats

1. Blaue Wäscheschutzschicht
2. Superabsorbierender Kern
3. Feuchtigkeitsregulierende Schicht
4. Sanft haftende Silikon-Wundkontaktschicht (adhäsive Variante)

- **Hohe Absorption auch unter Kompression**
- **Hohe Retention von Flüssigkeit und Bakterien**
- **Protease-Modulation**
- **Weich und flexibel**
- **Einfache Handhabung**
- **Große Auswahl von Größen**

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation)

Exsudat
viel bis sehr viel

Bakteriologie
keimarme Wunden

Indikation

ConvaMax™ Superabsorber eignet sich für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden mit übermäßiger Exsudation.

Produktnutzen

- Managt Exsudat effektiv, schützt die intakte Haut und hilft dabei, die Wundheilung zu unterstützen
- Weich und flexibel auf der Haut, einfach anzulegen und leicht zu entfernen. Die adhäsive Variante bietet eine sanfte Haftung für eine leichte Fixierung der Wundauflage
- Absorbiert große Mengen an Exsudat in seinem superabsorbierenden Kern (bis zu 177 g/100 cm²), schließt dieses sicher ein und schützt so die intakte Haut
- Nachdem das Exsudat absorbiert wurde, schließt ConvaMax™ die Flüssigkeit innerhalb des superabsorbierenden Kerns, auch unter Kompression, ein

Anwendung



Wählen Sie nach der Reinigung der Wunde eine geeignete Größe des ConvaMax™ Superabsorbers. Achten Sie darauf, dass der Wundverband die Wunde ausreichend überlappt.



Die weiße Wundkontaktschicht ist wundseitig auf Wunde und Haut anzulegen, während die blaue, wasserdichte Außenschicht die wundabgewandte Seite ist. Bei der Verwendung als Primärverband sollte ConvaMax™ Superabsorber in engem Kontakt mit dem Wundbett sein, um sicherzustellen, dass Wundexsudat absorbiert wird.

Fixieren Sie den Wundverband z. B. mit Fixierpflastern, Fixierbinden oder falls klinisch indiziert mit Kompressionsbinden.

Verordnungsinformation ConvaMax™ Superabsorber*

Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
adhäsiv			
7,5 x 7,5 (5 x 5) cm	10 Stück	422 575	156 344 20
10 x 10 (7,5 x 7,5) cm	10 Stück	422 576	156 344 37
10 x 20 (7,5 x 17) cm	10 Stück	422 577	156 344 66
15 x 15 (12 x 12) cm	10 Stück	422 579	156 344 89
15 x 20 (12 x 17) cm	10 Stück	422 580	156 344 95
20 x 20 (17 x 17) cm	10 Stück	422 581	156 345 03
nicht-adhäsiv			
7,5 x 7,5 (5 x 5) cm	10 Stück	422 566	156 343 25
10 x 10 (7,5 x 7,5) cm	10 Stück	422 567	156 343 31
10 x 20 (7,5 x 17) cm	10 Stück	422 568	156 343 48
15 x 15 (12 x 12) cm	10 Stück	422 570	156 343 60
15 x 20 (12 x 17) cm	10 Stück	422 571	156 343 77
20 x 20 (17 x 17) cm	10 Stück	422 572	156 343 83
20 x 40 (17 x 37) cm	10 Stück	422 574	156 344 14

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

VARIHESIVE® E

VARIHESIVE® E Border

Der bewährte Hydrokolloidverband



1. Wundkontaktschicht: Dreifach-Hydrokolloidmatrix, bestehend aus Natriumcarboxymethylcellulose, Pektin, Gelatine
2. Äußere Schicht: filmbeschichteter Polyurethanschaum

1. Wundkontakschicht: Dreifach-Hydrokolloidmatrix, bestehend aus Natriumcarboxymethylcellulose, Pektin, Gelatine
2. Äußere Schicht: filmbeschichteter Polyurethanschaum
3. VARIHESIVE® E Border mit zusätzlichem Polyacrylat-Fixierrand

- **Flexibel und anpassungsfähig**
- **Barriere gegen Viren und Bakterien**
- **Zuschneidbar**
- **Einfach zu applizieren und zu entfernen**
- **Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage**

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
kein bis wenig

Bakteriologie
keimarme Wunde

Indikation

VARIHESIVE® E / VARIHESIVE® E Border eignet sich für die Behandlung von trockenen bis feuchten Wunden, die akut oder chronisch sind. VARIHESIVE® E Border eignet sich durch den zusätzlichen Fixierrand speziell zur Versorgung von Wunden an Körperstellen, an denen eine besondere Haftung des Wundverbandes benötigt wird, z. B. im Sakralbereich.

Produktnutzen

- Bei Kontakt mit Wundexsudat kommt es zur Bildung eines Gels, das ein optimales, feucht-warmes Milieu für die Wundheilung schafft und die körpereigene Autolyse unterstützt
- Reduziert Wundschmerzen aufgrund der gelbildenden Eigenschaften

Anwendung

Um eine gute Haftung von VARIHESIVE® E / VARIHESIVE® E Border zu gewährleisten, sollte der Verband mindestens 3 cm über den Wundrand hinaus appliziert werden.

VARIHESIVE® E / E Border haftet nur auf trockener Haut.

Ab 3 mm Wundtiefe sollte ein Wundfüller, z. B. AQUACEL® Extra, Aquacel® Ag+ Extra oder KALTOSTAT®, verwendet werden.

Die Tropfenformen von VARIHESIVE® E Border eignen sich speziell für die Versorgung von Lokalisationen wie z. B. Sakralbereich oder Ferse.

Verordnungsinformation Varihesive® E

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
10 × 10 cm	10 Stück	187 639	075 228 07
10 × 10 cm	20 Stück	–	075 228 13
15 × 15 cm	5 Stück	187 661	038 177 01
20 × 20 cm	3 Stück	187 663	038 177 18
20 × 30 cm	3 Stück	187 642	038 177 24

Verordnungsinformation Varihesive® E Border

Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
10 × 10 (6 × 6) cm	5 Stück	187 970	044 747 00
14 × 14 (10 × 10) cm	5 Stück	187 971	044 747 17
20 × 20 (15 × 15) cm	5 Stück	187 972	044 747 46



Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

VARIHESIVE® Extra dünn

Dünner Hydrokolloidverband für maximale Anpassung

1. Wundkontaktschicht: Dreifach-Hydrokolloidmatrix, bestehend aus Natriumcarboxymethylcellulose, Pektin, Gelatine
2. Äußere Schicht: Polyurethanfilm

- **Weich, flexibel und anpassungsfähig**
- **Barriere gegen Viren und Bakterien**
- **Zuschneidbar**
- **Einfach zu applizieren und zu entfernen**
- **Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage**

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
kein bis wenig

Bakteriologie
keimarme Wunde

Indikation

VARIHESIVE® Extra dünn eignet sich für die Behandlung von trockenen bis feuchten Wunden, die akut oder chronisch sind. Im Speziellen ist der Einsatz von VARIHESIVE® Extra dünn bei folgenden Wunden indiziert:

- Hautabschürfungen
- Schnittwunden
- Hautrisse
- Hautschutz, um z. B. Reibung zu minimieren

Produktnutzen

- Bei Kontakt mit Wundexsudat kommt es zur Bildung eines Gels, das ein ideales feucht-warmes Milieu für die Wundheilung schafft und die körpereigene Autolyse unterstützt
- Reduziert Wundschmerzen aufgrund der gelbildenden Eigenschaften

Anwendung

Um eine gute Haftung von VARIHESIVE® Extra dünn zu gewährleisten, sollte der Verband mindestens 3 cm über den Wundrand hinaus appliziert werden.

VARIHESIVE® Extra dünn haftet nur auf trockener Haut.

Ab 3 mm Wundtiefe sollte ein Wundfüller, z. B. AQUACEL® Extra, Aquacel® Ag+ Extra oder KALTOSTAT®, verwendet werden.

Ein Verbandwechsel ist indiziert, wenn VARIHESIVE® Extra dünn gesättigt ist. Eine Sättigung ist erreicht, sobald der Wundverband eine Blase bildet.

Verordnungsinformation Varihesive® Extra dünn

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
7,5 × 7,5 cm	5 Stück	187 951	038 926 48
10 × 10 cm	5 Stück	187 954	038 926 54
15 × 15 cm	5 Stück	187 956	038 926 60
5 × 10 cm	10 Stück	187 959	038 926 77
5 × 20 cm	10 Stück	187 961	038 926 83
9 × 15 cm	10 Stück	187 920	016 708 20
9 × 25 cm	10 Stück	187 921	016 708 37

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

KALTOSTAT®

Calcium-Natriumalginat Wundauflage mit blutstillender Wirkung

❶ 100 % Kalzium-Natriumalginat aus der Braunalge Laminaria hyperborea

- In Kontakt mit Wundexsudat quellen die trockenen Fasern auf
- Durch die Aufnahme von Natrium-ionen aus dem Wundexsudat werden Kalziumionen aus dem Verband in die Wunde abgegeben und unterstützen die Blutstillung in der Wunde

Flexibel und anpassungsfähig

Zuschneidbar

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage

Art des Wundverbandes
Primärverband, Wundfüller

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation)

Exsudat
mäßig

Bakteriologie
keimarme Wunde

Indikation

KALTOSTAT® hat eine blutstillende Wirkung und eignet sich für die Behandlung von leicht blutenden und mäßig exsudierenden Wunden wie z. B.:

- Spalthautentnahmestellen
- Wunden nach Durchführung eines chirurgischen Débridements
- Abschürfungen
- Risswunden

Produktnutzen

- KALTOSTAT® besitzt durch seinen hohen Calciumanteil eine hämostatische Wirkung und eignet sich beson-ders zur Versorgung von leicht blutenden Wunden
- Enthaltene Guluronsäure gewährleistet die Formstabilität
- Fördert die Wundheilung durch Erhaltung eines idealen feucht-warmen Wundheilungsmilieus

Anwendung

Tiefe Wunden / Wundtaschen locker mit KALTOSTAT® auffüllen, KALTOSTAT® wundgerecht zuschneiden und nicht über den Wundrand applizieren.

KALTOSTAT® eignet sich nicht für stark blutende Wunden.

Blutende Wunden erfordern eine engmaschige Kontrolle durch den Arzt.

Verordnungsinformation KALTOSTAT®

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
Wundauflage			
5 × 5 cm	10 Stück	168 210	**069 653 65**
7,5 × 12 cm	10 Stück	168 212	**069 653 13**
10 × 20 cm	10 Stück	168 214	**069 653 36**
15 × 25 cm	10 Stück	168 215	**075 113 18**
30 × 60 cm	5 Stück	168 219	**075 113 24**
Tamponade			
2 g	5 Stück	168 117	**069 653 59**

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

CarboFlex®

Geruchsneutralisierende Wundauflage mit Aktivkohle

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation)

Exsudat
mäßig bis viel

Bakteriologie
übelriechende infektionsgefährdete / infizierte Wunde

Indikation

CarboFlex® eignet sich für die Behandlung von exulzerierenden Tumorwunden, Abszessen und infizierten Wunden zur Geruchsreduktion.

Produktnutzen

- Neutralisiert Wundgeruch
- Absorbiert überschüssiges Exsudat
- Fördert die Wundheilung durch Erhaltung eines idealen feucht-warmen Wundheilungsmilieus
- Verklebt nicht mit der Wunde

Weich, sanft und flexibel

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Empfohlene Tragedauer: maximal 3 Tage

Zusammensetzung

1. Ethylenmethylacrylat-Film (EMA-Film)
2. Absorptionskissen (Viskose, Polyethylen, Polypropylen)
3. Aktivkohleschicht
4. Ethylenmethylacrylat-Film (EMA-Film)
5. Hydrofiber® / Calcium-Natriumalginat-Gemisch

Anwendung

CarboFlex® darf nicht zerschnitten werden.

Zur Fixierung von CarboFlex® eignen sich nichthaftende Schlauchverbände, Mullbinden oder haftende Folienverbandstreifen.

CarboFlex® darf keinesfalls mit okklusiven Wundverbänden abgedeckt werden.

Verordnungsinformation CarboFlex®

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
10 x 10 cm	10 Stück	403 202	085 911 53
oval 8 x 15 cm	5 Stück	403 203	085 911 76
15 x 20 cm	5 Stück	403 204	085 911 82



Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

AQUACEL® Ag Burn

Antimikrobielle silberhaltige Hydrofiber® Wundauflage zur Behandlung von Verbrennungen zweiten Grades

1. Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2 % Silberionen
2. Nylonverstärkt

- **Weich, sanft, flexibel und gut anmodellierbar**
- **Einfach zu applizieren und zu entfernen**
- **Empfohlene Tragedauer: maximal 21 Tage**

Art des Wundverbandes
Primärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation)

Exsudat
mäßig bis viel

Bakteriologie
infektionsgefährdete / infizierte Wunde

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

Indikation

AQUACEL® Ag Burn eignet sich für die Behandlung von Verbrennungen der Haut ersten und zweiten Grades.

Produktnutzen

- Reduziert Bakterien zuverlässig durch eine kontrollierte und kontinuierliche antimikrobielle Wirkung der Silberionen
- Reduziert Wundschmerzen – in situ und bei Verbandwechsel aufgrund der gelbildenden Eigenschaften
- Fördert die Wundheilung durch Erhaltung eines idealen feucht-warmen Wundheilungsmilieus
- Ermöglicht Mobilisierung
- Kann bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden
- Leicht und rückstandsfrei zu entfernen

Anwendung

AQUACEL® Ag Burn sollte trocken und mindestens 2 cm über die Verbrennungswunde hinaus appliziert werden.

Bei Bedarf AQUACEL® Ag Burn mit einem saugfähigen Sekundärverband abdecken und fixieren. Der Sekundärverband sollte unter Verbleib von AQUACEL® Ag Burn regelmäßig gewechselt werden.

AQUACEL® Ag Burn kann bis zu 21 Tage auf der Verbrennungswunde belassen werden.

Sobald die Wunde epithelisiert ist, löst sich AQUACEL® Ag Burn von der Haut. Um die vollständige Entfernung des Wundverbandes zu erleichtern, kann dieser zuvor mit steriler Lösung befeuchtet werden.

Verordnungsinformation AQUACEL® Ag Burn

Größe	Packungsinhalt	REF	Original PZN
13 × 10 cm	5 Stück	403 786	002 151 20
15 × 17 cm	5 Stück	403 787	002 151 37
23 × 30 cm	5 Stück	403 788	002 151 43
54 × 45 cm	3 Stück	403 790	055 253 68
23 × 100 cm	3 Stück	403 789	002 151 66

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

AQUACEL® Surgical

Aquacel® Ag

Surgical



Art des Wundverbandes
Primärverband

Wundheilungsphase
Exsudation (Inflammation), Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
wenig bis mäßig

Bakteriologie
keimarme Wunde (AQUACEL® Surgical) infektionsgefährdete / infizierte Wunde (Aquacel® Ag Surgical)

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

Hydrofiber® Wundverband zur Behandlung von postoperativen Wunden

1. Wundkissen: Natriumcarboxymethylcellulose, verwoben mit Nylon- und Elasthangarn
2. Hydrokolloidhaftschicht
3. Polyurethanfilm

Antimikrobieller silberhaltiger Hydrofiber® Wundverband zur Behandlung von postoperativen Wunden

1. Wundkissen: Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2 % Silberionen, verwoben mit Nylon- und Elasthangarn
2. Hydrokolloidhaftschicht
3. Polyurethanfilm

Indikation

AQUACEL® Surgical eignet sich für die Behandlung von postoperativen Wunden, die wenig bis mäßig exsudieren. Aquacel® Ag Surgical eignet sich zur Behandlung von akuten chirurgischen Wunden, die infektionsgefährdet sind oder Anzeichen einer Infektion aufweisen.

Produktnutzen

- Reduziert oberflächliche postoperative Infektionen durch eine kontrollierte und kontinuierliche antimikrobielle Wirkung der Silberionen (Aquacel® Ag Surgical)
- Fördert die Wundheilung durch Erhaltung eines idealen feucht-warmen Wundheilungsmilieus
- Dehnbar und flexibel – Minimierung von Spannungsblasen
- Hoher Patientenkomfort

Weich, sanft, flexibel und gut anmodellierbar

Barriere gegen Viren und Bakterien

Einfach zu applizieren und zu entfernen

Empfohlene Tragedauer: maximal 7 Tage

Anwendung

AQUACEL® Surgical Wundverbände haften ideal auf trockener Haut.

AQUACEL® Surgical und Aquacel® Ag Surgical sollten nicht zerschnitten werden.

AQUACEL® Surgical und Aquacel® Ag Surgical dienen nicht als Ersatz für Methoden des primären Wundverschlusses wie z. B. Klammern oder Nähte.

Zur Behandlung von Inzisionen oder Wundnähten am Knie sollte das Knie zum optimalen Anlegen des Wundverbandes in einem Winkel von etwa 30 Grad gehalten werden.

Verordnungsinformation AQUACEL® Surgical

Größe (Inzision bis)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
9 × 10 (4) cm	10 Stück	412 017	002 786 75
9 × 15 (9) cm	10 Stück	412 018	002 786 81
9 × 25 (17) cm	10 Stück	412 019	003 079 22
9 × 30 (22) cm	10 Stück	–	090 608 54
9 × 35 (27) cm	10 Stück	412 020	003 226 08

Verordnungsinformation Aquacel® Ag Surgical

Größe (Inzision bis)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
9 × 10 (4) cm	10 Stück	412 009	003 531 58
9 × 15 (9) cm	10 Stück	412 010	003 818 70
9 × 25 (17) cm	10 Stück	412 011	003 826 80
9 × 30 (22) cm	10 Stück	–	090 608 60
9 × 35 (27) cm	10 Stück	412 012	004 251 71

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

VariHesive® Hydrogel®

Feuchtigkeitsspendendes Hydrogel

❶ Natriumcarboxymethylcellulose, Pektin

Wundheilungsphase
Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
kein bis wenig

Bakteriologie
keimarme, infektionsgefährdete und infizierte Wunde

Indikation

VARIHESIVE® Hydrogel® eignet sich im Speziellen bei trockenen bzw. schwach exsudierenden Wunden zur Herstellung eines feuchten Wundmilieus und zur Unterstützung der Autolyse bei Fibrinbelag und nekrotischem Gewebe.

Produktnutzen

- Fördert die autolytische Wundreinigung
- Unterstützt den Wundheilungsprozess durch Schaffung eines optimal feuchten Wundmilieus
- Der hohe Wasseranteil bewirkt eine schnelle Rehydratisierung von zu trockenen Wunden

Anwendung

VARIHESIVE® Hydrogel® sollte maximal 3 mm dick auf den Wundgrund aufgetragen werden.

Die Wunde sollte mit einem geeigneten Abdeckverband versorgt werden.

Zur Applikation bei tiefen Wunden eignet sich der sterile Applikator.

Hinweis zum Öffnen der VARIHESIVE® Hydrogel® Tube:
1. Verschlusskappe der Tube öffnen und den weißen Sicherheitsring entfernen
2. Verschlusskappe wieder auf die Tube schrauben, um die Membran zu durchstechen

Verordnungsinformation Varihesive® Hydrogel®

Handelsform	Packungsinhalt	REF	Original PZN
15 g	5 Stück	403 700	**000 406 89**
15 g	10 Stück	401 802	**000 406 72**

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

Avelle™

System für die Unterdruck-Wundtherapie

Das erste und einzige System, das Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) und Hydrofiber® Technologie vereint

Art des Wundverbandes
Primärverband, Sekundärverband

Wundheilungsphase
Granulation (Proliferation), Epithelisierung (Regeneration)

Exsudat
gering bis mäßig

Bakteriologie
keimarme Wunden

Hydrofiber® Technologie
für einen verlässlichen Wundrandschutz

Zusammensetzung Wundverband

1. Hautfreundlicher Silikonhaftrand
2. Hydrofiber® Wundkontaktschicht
3. Hydrofiber® Kern
4. Speziell konzipierte Schaumschicht
5. Polyurethanfilmschicht

Indikation

Avelle™ NPWT-System eignet sich für die Versorgung von chronischen, akuten und komplizierten Wunden mit geringer bis mäßiger Exsudation.

Produktnutzen

- Hydrofiber® Wundkontaktschicht bildet bei Kontakt mit Wundflüssigkeit ein formstabiles Gel und unterstützt ein problemloses und rückstandsloses Entfernen
- Verbesserung von Patientenkomfort und Lebensqualität: Patienten können mit dem Wundverband duschen, während der Unterdruck bis zu 1 Stunde lang aufrechterhalten wird
- Der Wundverband mit Hydrofiber® Technologie verhindert die Verunreinigung von Kleidung durch Exsudat

- **Appliziert 80 mmHg (+/- 20 mm Hg)**
- **Systemlaufzeit bis zu 30 Tage**
- **Klein und portabel**
- **Einfache Anwendung durch Ein-Knopf-Bedienung**
- **Wundverband verhindert Verunreinigung von Kleidung durch Exsudat**
- **Trägt zur Genesung und Rehabilitation bei, weil der Patient während der Anwendung aktiv bleiben kann**
- **Unterdruck bleibt nach Trennung von Pumpe und Verband bis zu 1 Stunde erhalten – Duschen problemlos möglich**

1. Pumpe
2. Luer-Lock-Anschluss
3. Ein-Knopf-Bedienung
4. Kontrollleuchten (optischer Alarm)
5. Hydrofiber® Wundverband

Applikation

Applizieren Sie den Wundverband über der Wunde. Stellen Sie dabei sicher, dass der Anschluss (Port) oberhalb der Wunde und über intakter Haut ist. Vermeiden Sie Faltenbildung – wenn nötig repositionieren.

Applizieren Sie die Fixierstreifen auf allen Seiten des Verbands mit 1 cm Überlappung, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

Verbinden Sie Pumpe und Verbandschlauch sicher miteinander, indem Sie die Konnektoren ineinander drehen (Luer-Lock-Verschluss).

Drücken Sie den blauen Knopf 3 Sekunden lang zum Starten und Beenden der Unterdrucktherapie.

Avelle™ System für die Unterdruck-Wundtherapie

Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF
Pumpe*		
Avelle™ Pumpe	1 Stück	421 551
Wundverbände (Größe des Pads)**		
16 × 16 (8 × 8) cm	5 Stück	421 552
16 × 21 (8 × 13) cm	5 Stück	421 553
12 × 21 (4 × 13) cm	5 Stück	421 554
12 × 31 (4 × 23) cm	5 Stück	421 555
12 × 41 (4 × 33) cm	5 Stück	422 155
21 × 26 (13 × 18) cm	5 Stück	422 156
26 × 26 (18 × 18) cm	5 Stück	422 157

* Jede Pumpe wird mit 1 x Verlängerungsschlauch und 6 x AAA-Lithiumbatterien geliefert.
** Jeder Avelle™ Verband beinhaltet 6 x adhäsive sterile Fixierstreifen.

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für eine vollständige Gebrauchsanweisung.

ESENTA™

Reizfreier silikonbasierter Hautschutz

Indikation

Die reizfreien Sprays, Applikatoren und Feuchttücher sorgen für einen atmungsaktiven Schutz vor Hautschäden, die durch Körperausscheidungen, Enzyme und Klebstoffe verursacht werden können.

Produktnutzen

- Verringert das Risiko von Hautschäden und -reizungen
- Hinterlässt keine Rückstände auf der Haut
- Ohne Zusatz von Alkohol
- Schnell trocknend

Reizfreier silikonbasierter Pflasterentferner

Indikation

Die alkoholfreien Sprays und Feuchttücher von ESENTA™ dienen der atraumatischen Entfernung von Wundverbänden, Basisplatten und Klebstoffresten von der Haut.

Produktnutzen

- Verringert schmerzhafte Hautablösungen und Hautschäden
- Entfernt schnell alle Kleberückstände
- Fühlt sich seidig und glatt an, es bleiben keine Rückstände zurück
- Frei von Alkohol, Duft- und Konservierungsstoffen
- Schnell trocknend

Verordnungsinformation ESENTA™ Hautschutz

Handelsform	Packungsinhalt	REF	Original PZN
Reizfreier Hautschutz-Applikator, steril			
1 ml	5 Stück	423 283	168 666 70
1 ml	25 Stück	423 284	168 666 87
3 ml	5 Stück	423 287	168 667 76
3 ml	25 Stück	423 285	168 667 01
Reizfreies Hautschutz-Spray / Reizfreie Hautschutz-Tücher			
Spray 28 ml	1 Stück	423 286	168 667 47
Tücher	30 Stück	423 282	168 666 64
Esenta Hautschutz			
Spray 50 ml	1 Stück	423 288	168 668 07

Verordnungsinformation ESENTA™ Pflasterentferner

Handelsform	Packungsinhalt	REF	Original PZN
Pflasterentferner-Spray / Pflasterentferner-Tücher			
Spray 50 ml	1 Stück	423 289	168 668 13
Spray, steril, 150 ml	1 Stück	423 290	168 668 42
Tücher	30 Stück	423 281	168 666 58

Kundenberatung

Wir sind für Sie da!

Ihr persönlicher Convatec Ansprechpartner steht Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur Verfügung.

ConvaTec (Germany) GmbH
Mühldorfstraße 8
81671 München
www.convatec.de

Bestellungen:
0800 - 162 43 81
de.kundenservice@convatec.com

Kundenberatung:
anfrage@convatec.com

Herausgeber:

ConvaTec (Germany) GmbH
Mühldorfstraße 8
D-81671 München
www.convatec.de
anfrage@convatec.com

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann der Herausgeber trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernehmen. Eine Gewähr für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann nicht übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, wie Nachdrucke, auch von Abbildungen, Vervielfältigungen jeder Art, Vortrag, Funk, Tonträger- und Fernsehsendungen sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, auch auszugsweise oder in Übersetzungen, behält sich Convatec vor.

© 2025
ConvaTec (Germany) GmbH

© 2025 ConvaTec (Germany) GmbH · März 2025 · Art.-Nr.: 57336-v4

convatec