

STERIL

PEMBALUT CGF™ EKSTRA NIPIS

Untuk perlindungan dan pengurusan ulcer dermis superfisial

PENERANGAN PRODUK

Pembalut DuoDERM Ekstra Nipis adalah sangat fleksibel, pembalut formula gel kawalan yang direka untuk digunakan pada luka kering kepada luka eksudat ringan. Pembalut DuoDERM Ekstra Nipis sangat sesuai di kawasan yang tertakluk kepada geseran dan yang memerlukan kontur, cth., siku, tumit.

Pembalut DuoDERM Ekstra Nipis berinteraksi dengan kelembapan luka menghasilkan jisim lembut yang membolehkan penanggalan pembalut dengan sedikit atau tiada kerosakan pada tisu yang baru terbentuk. Ia membantu mengasingkan luka terhadap bakteria dan pencemaran luaran yang lain.

INDIKASI

- Pengurusan ulcer dermis superfisial kering kepada eksudat ringan.
- Luka pasca pembedahan.
- Pembalut pelindung.

KONTRAINDIKASI

Tidak seharusnya digunakan pada individu yang sensitif kepada atau yang mempunyai tindak balas alahan terhadap pembalut atau komponennya.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

Apabila Digunakan pada Ulser Dermis:

1. Penggunaan awal produk ini perlu berada di bawah arahan pakar kesihatan.
2. Pembalut DuoDERM Ekstra Nipis menyediakan pengurusan setempat dari tapak luka. Dalam luka kronik aspek lain seperti penyusunan semula sokongan pesakit dan pemakanan tidak seharusnya diabaikan.
3. Peningkatan Saiz Luka: Kerosakan tisu yang lebih dalam mungkin sudah berlaku di bawah ulcer dermal superfisial yang jelas. Apabila menggunakan sebarang pembalut oklusif, khususnya dalam kehadiran bahan nekrotik, luka mungkin meningkat dalam saiz dan kedalaman semasa fasa awal pengurusan. Ulser kaki yang disebabkan oleh vaskulitis boleh dengan cepat merosot semasa eksaserbasi gangguan asas.

Bau: Luka, terutamanya yang besar atau nekrotik, adalah sering disertai dengan bau yang tidak menyenangkan; walau bagaimanapun, ini tidak semestinya menunjukkan jangkitan. Bau sepatutnya hilang apabila luka itu dibersihkan (lihat jangkitan).

Jangkitan: Sekiranya tanda jangkitan klinikal terbentuk, seperti: bau busuk tidak dikenali atau perubahan dalam warna eksudat, demam atau selulitis (kelembutan dan eritema di kawasan luka), kultur bakteria tapak luka perlu diambil. Jika terdapat tanda klinikal jangkitan, rawatan perubatan yang sesuai perlu dimulakan. Pembalut DuoDERM boleh diteruskan semasa rawatan mengikut budi bicara doktor.

MENYEDIAKAN DAN MEMBERSIHKAN TAPAK LUKA

Pembalut DuoDERM Ekstra Nipis adalah steril dan perlu dikendalikan dengan betul. Pilih pembalut yang akan memanjang sekurang-kurangnya 1 ½ inchi di luar margin luka. Bersihkan luka mengikut amalan hospital. Irigasi dengan salin dan keringkan kulit di sekelilingnya untuk memastikan ia bebas daripada sebarang bahan berminyak.

MEMASANG PEMBALUT

- 1) Minimumkan sentuhan jari dengan permukaan pelekatan.
- 2) Pasang dalam gerakan menggulung, elakkan regangan.

- 3) Ratakan pada tempatnya, terutamanya di sekitar tepi.
- 4) Apabila memasang pada tumit atau siku, ia mungkin berguna untuk memotong tahanan kira-kira 1/3 di setiap sisi pembalut untuk memudahkan pemasangan.
- 5) Pada ulser sakral, tekan ke lipatan anus (a) Bergantung pada lokasi dan kedalaman ulser sakral, pembalut yang berbentuk segi tiga boleh dipasang dalam bahagian berbeza (b).
- 6) Arah ini boleh memberi manfaat kepada ulser yang dekat dengan pinggir anus.
- 7) Gunakan pita hipoalergenik di sekitar tepi untuk mengemaskannya.

MENANGGALKAN PEMBALUT

1) Tekan pada kulit dan angkat tepi pembalut dengan berhati-hati. Teruskan di sekitarnya sehingga semua sisi telah bebas. Ulangi prosedur pembersihan. Ia adalah tidak perlu untuk menanggalkan semua sisa bahan pembalut dari kulit sekitarnya.

Biarkan pembalut di tempatnya (tidak lebih daripada 7 hari) kecuali jika tidak selesa, bocor atau terdapat tanda klinikal mengenai jangkitan.

Dibuat di Republik Dominicana



Jangan Guna Semula



Disterilkan dengan Sinaran Gamma



Nombor katalog



Pastikan kering



Batas suhu



Jangan Guna jika Bungkusan Rosak



Baca Arahan Penggunaan



Nombor Lot



Tarikh Tamat Tempoh



Pengilang