

J Í D E L N Í Č E K S T O M I K A

SCHUTÍ

do života!



ConvaTec

me+



Jaká bude výživa po operaci?	3
Jídelníček po operaci	6
Dietní opatření pro pacienty s komplikacemi na GIT (trávicím traktu) při/po chemoterapii	7
Doporučení při nechutenství	7
Co je parenterální výživa?	8
Co je enterální výživa?	8
Co je vláknina a jak je důležitá v našem jídelníčku.....	8
Pitný režim	9
Výživa v klidovém období	9
Když vás trápí tvorba plynů	9
Co je dobré vědět	10
Stomici a oslavy	10
Zdravý jídelníček po operaci	11
Jak změnit stravovací návyky aneb nikdy není pozdě	12
Desatero závěrem	14

© 2016, ConvaTec Česká republika s. r. o.

Odborná spolupráce: Marieta Balíková, nutriční terapeutka FN Motol

Jaroslava Pavlíčková, nutriční terapeutka FN Hradec Králové

JAKÁ BUDE VÝŽIVA PO OPERACI?



Základním úkolem výživy je dodávat organismu všechny důležité živiny ve správném poměru. Po operaci je nutné nějaký čas dodržovat dietu. Výživu doporučujeme upravit tak, aby bylo sníženo množství potravin způsobujících zažívací potíže, popřípadě je zcela vyřadit. I stomici by měli dodržovat zásady správné výživy jako zdraví lidé. Je však třeba mít na paměti odlišné anatomické poměry ve střevě, které vedou k nutnosti dodržovat specifická stravovací pravidla. Těsně po operaci je složení stravy jiné než v pozdější době. Propustností střevní sliznice dochází ke ztrátám bílkovin, minerálů a vitaminů.



Bílkoviny

Jejich nedostatek způsobuje zhoršené hojení ran, svalovou ochablost, tvorbu dekubitů, sníženou odolnost k infekcím.

Hlavními zdroji jsou maso, mléko, mléčné výrobky, vejce, z rostlinných pak luštěniny.

Tekutiny

K jejich ztrátám dochází v největší míře při průjmech. Nedostatek způsobuje suchost sliznic, pokles krevního tlaku a zrychlení pulsu, dezorientaci.

Vitaminy

Ke ztrátám vitaminů dochází při průjmech. Tělo je neumí samo vytvářet a je odkázáno na jejich přísun potravou. Vitaminy roz-

pustné v tukách (A, D, E, K) se v těle ukládají a vytvářejí tak určitou zásobu. Vitaminy rozpustné ve vodě tělo neukládá (kromě vitaminu B12), proto je nutné dodávat je průběžně.

Minerální látky

Vápník je hlavní stavební hmotou pro kosti a zuby, důležitou roli hraje při činnosti buněk a srážení krve, podporuje dobrou práci nervů a svalů. Ztráty vedou k osteoporóze, křečím, arytmií. Zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky, vysoké procento obsahuje též mák a sardinky. Draslík spolu se sodíkem slouží k udržování



rovnováhy tekutin a elektrolytů v buňkách a tkáních, reguluje krevní tlak, udržuje srdeční rytmus. Ztráty vedou k otokům, zvýšenému krevnímu tlaku, únavě, nervozitě. Je obsažen v zelenině, bramborách a v čerstvém i sušeném ovoci. Hořčík je

důležitou složkou kostí, podílí se na přenosu nervových vzruchů a hraje roli při kontrakci svalů. Ztráty způsobují tetanie, svalové záškuby, svalovou slabost, arytmií. Je obsažen v zelenině, citróněch, kukuřici, fíkách, jablkách.



V OBDOBÍ PO OPERACI VOLÍME BEZEZBYTKOVOU STRAVU

Technologická úprava

Při přípravě jídel používáme vaření, dušení, pečení bez tuku pod poklicí, aby se vytvořila kůrka. Maso nejprve zbavíme viditelných, nestravitelných zbytků, opečeme nasucho, podlijeme netučným vývarem nebo vodou a přikryté dusíme nebo pečeme. Šťávu či omáčku na maso zahustíme moukou, na sucho opraženou a rozmíchanou ve vodě. Šťávy nerestujeme, ani nepoužíváme jíšku. Do hotového pokrmu přidáme čerstvé nepřepálené máslo.



V klidovém období můžeme připravit jídlo i smažením. Je důležitá příprava smaženého jídla. **Potravinu vkládáme do rozpáleného tuku a po dokončení rychle opláchneme pod vařící vodou a osušíme v ubrousku.** POZOR na přepálené tuky!!! V časném období po operaci se vyvarujeme smažení, pečení na tuku a přidávání jíšky. Jídlo podáváme v klidném prostředí, raději v menších porcích (5–6x denně) ani horké, ani studené. Podávaná jídla by měla mít pokojovou teplotu. Pro úpravu mikrobiální střevní rovnováhy použijeme probiotika (například *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*), která chrání zažívací trakt, snižují hladinu cholesterolu, působí proti infekci a harmonizují zažívání po antibiotické léčbě (jogurty, jogurtová mléka, tvarohové sýry, některé uzeniny). Pokud potřebujete vyšší energii, můžete přidávat dietetické moduly – přípravky zvyšující energii nebo bílkoviny.

Výběr potravin

Strava je přísně individuální – jednoznačné stanovisko při výběru jídel nelze určit.

Pečivo: suchary, veka, rohlíky netučné, piškoty, starší vánočka.

Mléko a mléčné výrobky: mléko nepodáváme jako samostatný nápoj. Pokud snášíte mléčné výrobky, používejte sýry, krájený sýr, polotučný tvaroh, bílé a ovocné jogurty s živými kulturami.

Polévky: vývary z hovězího nebo drůbežího masa, ze kterého odstraníme viditelný tuk, doplníme rýží, těstovinou, kapáním, bílkem. Zahustěné polévky obilninové, lisované bramborové, zeleninové, žemlové.

Maso: libové hovězí, vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, králíčí, filé, kapr, šunka,



také klokani, pštrosí, losos, treska. Bílá masa podáváme bez kůže.

Přílohy: dušená rýže, těstoviny, jemný knedlík (na kypření používáme pečivový prášek, sodu, minerální vody), bramborová kaše.

Omáčky: rajská, koprová (při snášenlivosti mléka), dietní svíčková s prolisovanou zeleninou.

Tuky: čerstvé máslo na pečivo nebo na omaštění pokrmu, jednodruhové oleje.

Vejce: jako samostatný pokrm nepodáváme, k přípravě jídel používejte celá vejce v menším množství. Vaječný bílek je vhodné používat k přípravě pokrmů v neomezeném množství.

VHODNÉ KOŘENÍ A BYLINKY

bazalka	pomerančová kůra
dobromysl (oregáno)	puškovec
fenykl	rozmarýn
kmín	saturejka
koriandr	tymián
majoránka	muškátový oříšek
máta	paprika sladká
mateřídouška	skořice
meduňka	šalvěj
pažitka	levandule
petrželka	

bílkový chlebiček, ovocné řezy se želatinou, ovocný kysel, při snášenlivosti mléka vanilkový krém, bílková pěna šlehaná s džemem, tvarohový krém šlehaný s džemem, sněhové pečivo.

Ovoce: výběr je omezený, ze syrových druhů můžeme podat pouze zralé banány. Vyzrálá jablka, broskve a meruňky zbavíme jader a slupek. Pokud máme zdravý chrup a dobře koušeme, po nastrohání můžeme toto ovoce jíst syrové. Jinak podusíme a prolisujeme.

Zelenina: nepoužíváme syrovou, nejvhodnější je vařená mrkev, jemně nastrohaná nebo rozmixovaná. Celer, petržel, špenát, hlávkový salát jemně krájený, bylinky pro zpestření.

Koření: pokrmy mírně solíme, kořeníme jemně mletým kmínem nebo vývarem z kmínu, koprem, petrželovou natí, vanilkou, citrónovou šťávou. K ochucení jídel je možné použít kořenící přípravky. Vegi-vegi a Family-vegi.



V klidovém období, ne v ranných stádiích po operaci, můžeme pro zastření chuti a vůně některého jídla použít i výraznější koření (např. do pomazánek dáme česnek, hořčici, kyselou okurku, kečup, cibuli, citrónovou šťávu apod.)

Moučníky: podáváme v omezeném množství, nepoužíváme těžké, máslové krémy. Vhodné jsou piškotová roláda s džemem, piškotová bublanina s meruňkami, piškot s citrónovou polevou,

JÍDELNÍČEK PO OPERACI

Týdenní jídelní lístek pro bezsezbytkovou dietu – č. 5



Den	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře
Pondělí	bílá káva, rohlíky, máslo, med	jablečné pyré	polévka rýžová (lisovaná), Moravský guláš, knedlík jemný	loupáček, kakao	zapečené těstoviny se šunkou, Fruko
Úterý	čaj s mlékem, houška, máslo, sýr eidam	pomerančová šťáva	polévka nudlová, hovězí na žampionech, bramborová kaše, broskvový kompot	toustový chléb, biokys	ovocné knedlíky z tvarohového těsta
Středa	bílá káva, rohlíky, máslo, ovocný jogurt	banán	polévka krupicová s vejcem, vepřové protýkané šunkou, rýže, salát z vařené mrkve	piškoty, Malcao	tavený sýr, veka, máslo
Čtvrtek	čaj s mlékem, houška, máslo, džem jahodový	jablkový kysel (šťáva se zahustí pudinkem bez mléka)	polévka bramborová mixovaná, klopsy v rajske omáčce, těstoviny	toustový chléb, kyška	dušený kuřecí plátek, bramborová kaše, krájený hlávkový salát
Pátek	kakao, rohlíky, máslo, šlehaný tvaroh	mandarinková šťáva	polévka žemlová, vaječná sedlina se šunkou, dušený špenát, bramborová kaše	loupáček, bílá káva	rýžová kaše, meruňkový kompot

Den	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře
Sobota	Malcao, houška, máslo, šunka	banán	polévka rajska s kapáním, pečené filé, bramborová kaše, kompot	veka, acidofilní mléko	bílá káva, veka, máslo, bílý jogurt
Neděle	čaj s mlékem, toustový chléb, vaječná pomazánka s pažitkou	broskvové pyré	polévka mrkvová, kuřecí plátek na másle, těstoviny, kompot	rohlíky, bílá káva	vanilkový pudink s piškoty

V období po operaci se doporučuje omezit sladkosti, protože působí kvašení ve střevech (plynatost, těžko od žaludku, únava).

DIETNÍ OPATŘENÍ PRO PACIENTY S KOMPLIKACEMI NA GIT (TRÁVICÍM TRAKTU) PŘI/PO CHEMOTERAPII

Proděláváte nebo jste již prodělali náročnou léčbu, která může být doprovázena různými komplikacemi způsobenými poškozením některé z částí zažívacího traktu. V dutině ústní může docházet ke změnám vnímání chuti, k polykacím obtížím, bolestem v ústech, k suchosti sliznic. Na oslabené sliznici střeva mohou vznikat záněty, docházet může k malabsorpcím (poruchám vstřebávání živin), průjmům nebo naopak k zácpě.

DOPORUČENÍ PŘI NECHUTENSTVÍ

- volný, neškrtící oděv
- vyhýbat se „pachům z kuchyně“
- individuální výběr pokrmů
- podávat častěji malé porce pokrmů
- lehce stravitelné a nedráždivé pokrmy



- nepodávat: tučné potraviny a pokrmy, smažené pokrmy, koncentrované pokrmy, příliš horké pokrmy a nápoje
- u dětí se snažíme nazdobit talíř, vytvořit různé tvary např. zvířátek
- jídlo konzumuje celá rodina

- vyhýbáme se výrazům, které od jídla odrazují
- před hlavními jídly nepodáváme nic, co by způsobilo zasyčení, v těchto případech se doporučuje pikantnější pestrá strava (výjimka potvrzuje pravidlo), aby jídlo mělo výraznější chuť (čichové a chuťové buňky jsou v tomto období poškozeny)
- po jídle odpočívat v polosedě
- nápoje mezi jídly a bez CO₂
- žaludeční nevolnost zmírňuje: „vyprchaná“ cola po lžičkách, neperlivá voda s citrusy, led v nápojích, slané netučné crackery
- při změnách chuti je vhodné čistit častěji zuby, vyplachovat ústa, zvýraznit chuť kořením
- chvála bílkovinám, pozor na volné sacharidy
- plnohodnotná náhrada masa = krájené sýry
- kvalitní náhrada masa = vejce, tvarohové a termizované sýry, tvaroh, pudink, mléčné dezerty, zakysaná mléka

CO JE PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA?

Parenterální výživa je umělá výživa, která je podávána přímo do krevního oběhu. Podává se pouze tehdy, pokud nemocný není schopen přijímat stravu a netoleruje výživu enterální. Obsahuje glukózu, bílkoviny, tuky, minerály, vitaminy, stopové prvky.

CO JE ENTERÁLNÍ VÝŽIVA?

Enterální výživa je umělá výživa, určená pro podání do zažívacího traktu. Výhodou je šetrnost pro pacienta. Zlepšuje funkci střevní stěny. Podává se sondou (tenká trubička zavedená nosem do žaludku nebo do tenkého střeva). Může se podávat i ústy, popíjením, jako doplněk stravy.

V současné době je na trhu mnoho výrobků s rozsáhlou škálou příchutí. Jako doplněk stravy doma doporučujeme vychladit a popíjet mezi jednotlivými jídly. Můžeme použít i k tepelné úpravě při přípravě jídel.

CO JE VLÁKNINA A JAK JE DŮLEŽITÁ V NAŠEM JÍDELNÍČKU?

Vlákninu dělíme na rozpustnou ve vodě, ta je obsažena v ovoci, a jejím zástupcem je pektin. Dále pak na vlákninu nerozpustnou, která váže vodu jen velmi málo a ta je obsažena v luštěninách a celozrnném pečivu, slupkách, ořeších, semenech, houbách.



V klidové fázi po rekonvalescenci je vhodné postupně potraviny s vyšším obsahem vlákniny opět zařazovat do jídelního lístku, protože má mnoho pozitivních účinků:

- zpomaluje vstřebávání a trávení
- snižuje hladinu tuku v krvi
- snižuje krevní tlak
- snižuje riziko rakoviny tlustého střeva
- velice pozitivně působí proti zácpě i proti průjmům

Doporučená denní dávka je 20–40 g. Rozpustnou vlákninu můžeme zakoupit i v lékárně jako výživový doplněk.



PITNÝ REŽIM

Doporučuje se pít dostatek tekutin, polovina z doporučeného množství by měla být obyčejná kohoutková voda. Je doporučováno 30 ml na kilogram hmotnosti. Pití nápojů oddělujeme od konzumace tuhé stravy. Vhodné jsou čaje, minerální vody bez CO₂, nesyčené stolní vody, slabé ovocné šťávy ředěné vodou, džusy, mrkvová šťáva. Pozor – nedostatek tekutin může přivodit zácpu nebo ucpání stomie. Ovocné a zeleninové šťávy mají mírně projímavý účinek.



VÝŽIVA V KLIDOVÉM OBDOBÍ

Po odeznění komplikací, pokud se budete cítit dobře, není striktní omezení ve výběru potravin. Váš energetický a biologický příjem musí zabezpečit fyzickou aktivitu. Pokud máte sklony k nadváze, upravte příjem stravy vhodným výběrem, množstvím a úpravou potravin. Stravování je zcela individuální, každý si musí

vytipovat vhodné potraviny, které mu nebudou způsobovat nadýmání, bolesti břicha, plynatost. Zpočátku je dobré opatrně ochutnat nově zařazené jídlo a poznamenat si druh, množství a zkušenosti s ním. Jedno jídlo nemusí vyhovovat dvěma různým lidem.

KDYŽ VÁS TRÁPÍ TVORBA PLYNŮ...

Pokud máte potíže s plynatostí, omezte následující potraviny: nápoje s kofeinem (čaj, cola, káva), nápoje s bublinkami, pivo, květák, kedluben, česnek, chřest, pažitku, cibuli, zelí, reveň, čerstvé ovoce – zejména hrušky, ořechy, vejce, vaječné výrobky, majonézu, ryby, uzené maso, houby, živočišné tuky, ostré koření.

Do jídelníčku naopak zařadte potraviny, které tvorbu plynu potlačují: čaje a výluhy z borůvek či brusinek, petržel, hlávkový salát, špenát, jogurty, kyselá jablka. Kromě vyjmenovaných potravin může tvorbu plynů vyvolat i spolykaný vzduch při rychlém jídle, hladovění, nedostatek pohybu, špatné kousání. Také celozrnné potraviny u někoho způsobují nadýmání, vhodné je vyzkoušet různé druhy. Při potížích s nadýmáním zkuste natáhnout nohy a masírovat břicho.



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Potraviny projímavé:

alkoholické nápoje, pivo, sušené švestky, fíky, čerstvé ovoce, ovocné šťávy (mimo borůvek), reveň, zelí (i kysané), cibule, káva, mléko, ovesná kaše, nápoje s bublinkami, ostré koření, hovězí bujón, lněné semínko (drcené), nehlazená rýže, sladký mošt, hrozny, celozrnný chléb, pšeničné otruby, ledová voda, cukr.

Potraviny spíše stavějící:

strouhaná jablka se slupkou, banány, borůvky, rozinky, brambory, kukuřice, ovesné vločky.



STOMICI A OSLAVY

Po rekonvalescenci a pokud se budete cítit dobře, není důvod se nějak omezovat. Doporučuji vybírat potraviny, které máte vyzkoušené a dobře je tolerujete. Můžete si dopřát pivo (pozor na plynatost), kvalitní červené nebo bílé víno (nepřislažované víno – pozor na sacharidy), 1–2 drinky.



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK

Příklad pro již zdravé stomiky – cca půl roku po operaci



Den	Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře
Pondělí	2 krajíce chleba, tvaroh s kapií, čaj	salátová okurka	polévka s masovými knedlíčky, králík na zelenině, dušená rýže	banán, jogurtový nápoj	treska se šunkou, bramborová kaše, rajčatový salát
Úterý	2 kornspitze, zakysaný dezert, čaj	strouhaná mrkev s jablky	polévka zeleninová s kapáním, hovězí po italsku, těstoviny	ovocný salát s bílým jogurtem	vepřová roláda, chléb, salát z čínské zeli
Středa	zapečené toasty s debrecínskou pečení a sýrem, čaj	rajče	polévka vločková, kuřecí řízek, brambory, salát s mrkví a jablky	pudink	těstovinový salát s tuňákem
Čtvrtek	jablkový závin, čaj	broskve	polévka bramborová, pizza se šunkou a sýrem, řecký salát	ovocný kefír	kuskus se zeleninou a kuřecím masem
Pátek	2 krajíce tmavého chleba, sýr Cottage, čaj	kapie	polévka česneková, vepřová pečeně bramborový knedlík, dušené kedlubnové zeli	bílý jogurt	pohankové palačinky s ovocným tvarohem kompot

Pokud je vaše zažívání již stabilizováno, je dobré, aby vaše strava byla bohatá na bílkoviny, dostatek vápníku (mléčné výrobky, ne pití mléka), ryby, hořčik a draslík.

JAK ZMĚNIT STRAVOVACÍ NÁVYKY aneb nikdy není pozdě

Motivací k rozhodujícímu kroku je mnoho. Jedna věc je rozhodnutí a druhá vydržet a nezklamat sebe ani své blízké. Při plánování jídelního lístku dbáme na výběr potravin s co nejmenším obsahem tuku. K technologické úpravě pokrmů používáme vaření, dušení, grilování bez přídavku tuku.

1/ Maso

Opékáme nasucho, podlijeme vodou nebo vývarem ze zeleniny a dusíme. Pokud použijeme vývar z masa, necháme bujón vychladnout a sebereme veškerý tuk. Vybírejte málo tučné maso. Živočišný tuk přispívá větší měrou ke zvýšené hladině cholesterolu, který způsobuje zužování cév. Výsledkem může být vysoký krevní tlak, infarkt nebo mozková mrtvice

Nevhodné maso: tučné vepřové a hovězí, husa, kachna s kůží, sekaná masa, uzeniny, rychlé občerstvení tzv. fast food – hamburgery apod.

Kuchyňská úprava: odstraňte viditelný tuk, použijte méně tuku při vaření, vhodné jsou teflonové pánve, mikrovlnné trouby, grilování v alobalu. Jezte bílá masa, králíky, ryby, občas libové hovězí nebo vepřové maso. Z uzenin vybírejte výrobky z drůbežího masa, kvalitní uzeniny – šunky, debrecínské pečeně.



2/ Mléko, mléčné výrobky

Trh nabízí dostatek výrobků v polotučné formě, vhodné jsou sýry do 30 % tuku v sušině (např. eidam 30 %, tavené sýry 30 %, Cottage, Olomoucké tvarůžky, jogurty s obsahem tuku do 3,5 %).

3/ Máslo či nízkotučný margarín

Většinou se máslo používá na namazání chleba a rohlíků. Na vaření máslo nepoužívejte (použijte nádobí, kde není třeba dávat tuk, nebo použijte jen malé množství oleje pod maso).

4/ Pečivo, cereálie

Bílé a sladké pečivo, používejte všechny druhy dalačů, chlebů, rohlíků. Ty obsahují více vlákniny, vitamínů a minerálů. Vláknina podporuje pohyb střev a tím zabraňuje zácpě. Dobré jsou celozrnné snídaně – cornflakes, ovesné vločky, müsli s nízkotučným mlékem nebo jogurtem a ovocem. Na trhu jsou celozrnné těstoviny

a neloupaná rýže. Výrobky, které obsahují semena nebo ořechy – konzumujte v malém množství.

5) Ovoce, zelenina

Obsahují vlákninu, vitamíny a minerály. Doporučené množství: 4–5 porcí zeleniny, 3–4 porce ovoce. Vypadá to jako velké množství, ale...

...začněte ráno např. jedním rajčetem (jinou zeleninou) ke kousku pečiva se sýrem
...mezi snídaní a obědem a obědem a večerí zvládnete ovoce, další porci můžete sníst u televize místo nějakého pamlsku
...k obědu a večerí si dáte zeleninový salát či dušenou zeleninu

...zásoba mražené zeleniny je k dispozici kdykoliv

...brambory jsou vhodnější než knedlíky

6) Luštěniny

Jako zelenina obsahují velké množství nestravitelných složek, minerálů a vitamínů. Jsou bohaté na bílkoviny a obsahují méně tuku než maso. Jsou dobře sytivé, nemusíte k jídlu přikusovat rohlíky. Nádýmavosti je zbavíte ponořením do vody na několik hodin, vodu nepoužíváme na při-

pravu pokrmu. Luštěniny se dají připravovat i jinak, než je klasická kaše, polévky, ochutnejte z nich saláty v kombinaci se zeleninou či těstovinami. Po úpravě luštěnin propasírujeme přes síto, abychom se zbavili velkého množství nestravitelné vlákniny.

7) Nápoje

Aniž si to uvědomíte, přijmete mnoho kalorií v nápojích jako je cola a jí podobné. Žádné kalorie nemá voda, minerálky, nestravené ovocné a zelené čaje. Ovocné džusy jsou sladké, ale obsahují vitamíny (diabetici je omezí) a rozpustnou vlákninu.

8) Alkohol (dětí ho nepijí vůbec)

Dodává prázdné kalorie a podporuje chuť k jídlu. Záleží na množství vypitého piva nebo vína. Velké množství nahradí bohatou porci jídla, malé množství nevedí.

9) Pestrost, barevnost

Pestrá strava není totéž co barevná. Pestrá v tomto znění znamená vyvážená, nevynechává žádné složky potravy (např. jako u vegetariánů). Barevnost zajistí rozmanitost zeleniny a ovoce. Hledejte v receptech u známých, v různých kuchařkách apod.



DESATERO ZÁVĚREM...

1. Pijte dostatečně (2–2,5 l denně) a jezte vícekrát denně v menších dávkách.

2. Dbejte na rozmanitost jídla.

3. Jezte v klidu.

4. Jídlo si vychutnávejte.

5. Důkladně jídlo kousejte a žvýkejte.

KOLOSTOMICI

Omezte jídla, která podporují zápach a nadýmání (nadýmavá zelenina, luštěniny). Pijte dostatečné množství tekutin. Jídla vybírejte dle individuální snášenlivosti a ta, po kterých cítíte nadýmání či plynatost, vyřadte ze svého jídelníčku.

ILEOSTOMICI

Omezte příjem vlákniny. Každé sousto pečlivě rozžvýkejte. Pijte dostatečné množství tekutin.

Jezte hodně ryb, ovoce a zeleniny.

6.

Omezte sladké, tučné pokrmy, ostrá jídla a alkohol.

7.

Dodržujte hygienu přípravy i konzumace pokrmů.

8.

Zařadte dostatek vlákniny a kysané mléčné výrobky.

9.

Dbejte na to, aby potraviny byly čerstvé.

10.

UROSTOMICI

Pijte dostatečné množství tekutin. Omezte příjem citrusových plodů a nadýmavé zeleniny.





ConvaTec
800 321 222
pro volajícího zdarma



800 122 111
pro volajícího zdarma

WWW
convatec.cz



ConvaTec

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1