AQUACEL® Foam
Guardianes de la Piel



Guia de aplicación

Con el apósito AQUACEL® Foam puede beneficiarse de las siguientes caracterísiticas:

- Se puede cortar para adaptar†
- El adhesivo no se adhiere a los guantes o a sí mismo†
- Fácil de aplicar y retirar†
- El paciente se puede duchar[1*†]
- Barrera antibacteriana y antiviral[1*†]
- Tiempo de uso recomendado máximo 7 días
- Suave, agradable, flexible y adaptable†
- Efectivo frente a compresión[2*†]

* Tal y como demostrado *in vitro*. † Por favor refiérase al prospecto de producto del apósito AQUACEL® Foam para las instrucciones de uso completas.

Aplicación estándar: Apósito primario

Utilizado como apósito primario, el apósito AQUACEL® Foam se puede aplicar en cualquier zona corporal, incluso en aquellas más complicadas.

Aplicación del apósito
Asegure que la piel perilesional está limpia y seca. Escoja un apósito de tamaño y forma donde la almohadilla central sea 1 cm mayor que la superficie de la herida.

Puede cortar el apósito al tamaño que necesite según sus necesidades.

Para asegurar que el apósito se mantiene aplicado puede considerar un vendaje de sujeción u otro método de fijación.†

1. Cuando utilice un vendaje de compresión, inicie el vendaje empezando por el pie.
2. Aplique el apósito AQUACEL® Foam no adhesivo y continúe aplicando el vendaje compresivo.
3. Continúe aplicando el vendaje.

Aplicación mejorada: Apósito secundario

El apósito AQUACEL® Foam es el único apósito de espuma diseñado para trabajar conjuntamente con los apósitos AQUACEL® Extra™ y AQUACEL® Ag+ Extra™* para ayudar a optimizar la cicatrización de la lesión.[3,4]

PerfectPartners

POWERED BY Hydrofiber TECHNOLOGY

Utilice el apósito **AQUACEL® Extra™** con el apósito **AQUACEL® Foam** para proporcionar una absorción extra en heridas altamente exudativas y/o lesiones cavitadas.

Utilice el apósito **AQUACEL® Ag+ Extra™** con el apósito **AQUACEL® Foam** para heridas altamente exudativas que estén infectadas, presenten riesgo de infección o donde sospeche que hay biofilm.

Úlcera por presión sacra

1. Si la lesión está cavitada, rellene con el apósito AQUACEL® que requiera, cortando el apósito para adaptarlo al tamaño de la lesión.
2. Doble el apósito por la mitad, y colóquelo siguiendo las estructuras anatómicas.
3. Asegúrese que la almohadilla del apósito AQUACEL®Foam es 1 cm mayor que el área de la lesión. Fije bien el apósito a la piel. Corrija cualquier arruga para fijar el apósito.

Úlcera de pie diabético

1. Aplique el apósito AQUACEL® Foam al pie por debajo de la lesión.
2. Si hay una cavidad presente, corte o doble el apósito primario de AQUACEL® requerido.
3. Rellene la lesión con el apósito primario de AQUACEL® sellando el apósito hacia arriba.
4. Fije bien el apósito a la piel. Corrija cualquier arruga para fijar el apósito.

Úlcera por presión en talón

1. Ante una cavidad, doble o recorte el apósito primario de AQUACEL® que requiera, y aplíquelo a la lesión.
2. Asegure el apósito AQUACEL® Foam sobre la lesión desde la parte superior del talón hacia la planta del pie.
3. Fije bien el apósito a la piel. Corrija cualquier arruga para fijar el apósito.

Retirada del apósito

El apósito debería ser cambiado cuando esté clínicamente indicado (por ejemplo: ante fugas, sangrado, incremento de dolor, o sospecha de infección). La herida se debería limpiar con intervalos apropiados.

Para retirar el apósito, presione sobre la piel, y con cuidado retire uno de los bordes del apósito. Continúe hasta que todos los bordes esten libres. Retire el apósito cuidadosamente y deséchelo según los protocolos clínicos locales.

AQUACEL® Foam

Código ConvaTec	Tamaño apósito	Apósitos por caja
Adhesivo		
420680	10 x 10 cm	10
420619	12,5 x 12,5 cm	10
422350	15 x 15 cm	10
420621	17,5 x 17,5 cm	10
420623	21 x 21 cm	5
420625	19,8 x 14 cm (talón)	5
420626	20 x 16,9 cm (sacro)	5
No adhesivo		
420633	10 x 10 cm	10
420635	15 x 15 cm	5
420636	20 x 20 cm	5

Código Nacional	Tamaño apósito	Apósitos por caja
Adhesivo REEMBOLSADOS		
493064	12,5 x 12,5 cm	3
482133	17,5 x 17,5 cm	3
493601	19,8 x 14 cm (talón)	3
493619	20 x 16,9 cm (sacro)	3
No adhesivo REEMBOLSADOS		
493072	15 x 15 cm	3

Para tener todos los beneficios de una capa de Hydrofiber® utilice AQUACEL® Foam como apósito primario o secundario.

AQUACEL® Extra™

Código ConvaTec	Tamaño apósito	Apósitos por caja
AQUACEL® Extra™		
420671	5 x 5 cm	10
420672	10 x 10 cm	10
420673	15 x 15 cm	5
403770	AQUACEL® Cinta 2 x 45 cm	5

Código Nacional	Tamaño apósito	Apósitos por caja
AQUACEL® Extra™ REEMBOLSADOS		
480202	5 x 5 cm	3
480210	10 x 10 cm	3
480228	15 x 15 cm	3
480236	AQUACEL® Cinta 2 x 45 cm	3

Provea un extra de absorción a las heridas crónicas y agudas con exudado de moderado a abundante.

AQUACEL® Ag+ Extra™

Código ConvaTec	Tamaño apósito	Apósitos por caja
AQUACEL® Ag+ Extra™		
413566	5 x 5 cm	10
413567	10 x 10 cm	10
413568	15 x 15 cm	5
413569	20 x 30 cm	5
413571	AQUACEL® Ag+ Cinta 2 x 45 cm	5

Código Nacional	Tamaño apósito	Apósitos por caja
AQUACEL® Ag+ Extra™ REEMBOLSADOS		
496042	5 x 6 cm	3
496059	10 x 13 cm	3
496067	15 x 14,5 cm	3
496075	AQUACEL® Ag+ Cinta 2,5 x 45 cm	3

Una formulación anti-biofilm única para heridas crónicas y agudas infectadas o con riesgo de infección, con nivel de exudado de moderado a abundante.

Para saber más acerca de los apósitos, por favor contacte con nosotros a través del teléfono: 93 602 37 37 o a través del email: infotec@convatec.com

www.convatec.es

ConvaTec

1. AQUACEL™ Foam Dressing – Waterproofness, Bacterial and Viral Barrier Testing. WHRI3538 MS069Data on File, ConvaTec Inc. **2.** WHRI3770 TA286 A Comparison of the In vitro Bio-Physical Performance Characteristics of Silicone Foam Dressings used in Wound Management. Data on file, ConvaTec. **3.** Mixing Wound Dressings: Does it Affect Clinical Outcomes, Tickle. J. Poster presented at World Union of Wound Healing Societies, 2016. **4.** Visual Assessment of Fluid Handling by AQUACEL® Extra covered by Different Foam Dressings WHRI5397 MS147. Data on file, ConvaTec Inc.

®/™ son marcas que pertenecen a sus respectivos dueños
©2019 ConvaTec Inc. AP-019946-ES AQF1902